

Gäller för: Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn, Verksamhet
Barncancercentrum, Verksamhet AnOplva neonatal barn, Barnhjärtcentrum
Innehållsansvar: Frida Kjellberg, (frikj1), Barnsjuksköterska
Granskad av: Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare
Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-20

Giltig till: 2028-05-20

Behandling av granulom runt gastrostomi

Förändringar sedan föregående version

Ny behandlingsmetod med bordsalt

Sammanfattning

Behandlingsmetoder för granulom runt gastrostomi hos barn.

Bakgrund och syfte

Att beskriva olika behandlingsmetoder för granulom runt gastrostomi hos barn. Ett granulom är en röd svulstig upphöjning som växer i eller runt stomat – svallkött. Granulomet kan vätska och vara lättblödande.



Utförande

Granulom kan behandlas med grupp 3 steroider enligt ett schema. Antingen med salva alternativt med droppar. De kan också behandlas med finkornigt bordsalt. Ibland kan behandling med silverniträt, lapis behövas. I sista hand används kirurgisk åtgärd.

Se de olika behandlingsmetoderna nedan

Åtgärd

<p>Kräm grupp 3 steroid; tex Elocon Kräm 0,1% eller Betnovat kräm 0,1%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Total behandlingstid 17 dagar enligt schema, se nedan. • Rengör runt stomat med tvål och vatten. • Skydda frisk hud med hudbarriär till exempel Cavilon. • Använd rikligt med salva. • Sätt en kompress runt knappen till exempel Skin X
<p>Droppar grupp 3 steroid; tex Elocon Kutan lösning 0,1% 100ml eller Dexafree 0,1% ögondroppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör runt stomat med tvål och vatten • Skydda den friska huden runt stomat med hudbarriär. • Droppa 3 droppar Elocon i stomat morgon och kväll i 7 dagar. • Sätt en kompress runt knappen till exempel Skin X
<p>Lapis (silverniträt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedöva huden med Xylocaingel 2% ca 5 minuter innan behandling. • Skydda den friska huden med hudbarriär, tex Cavilon. • Tryck (dutta) Silverniträtspinnen mot granulomet. • Täck området med en kompress. • Behandla var annan till var tredje dag, ca 3–4 tillfällen. • Eloconkräm kan med fördel läggas på efter behandling. • Sätt en kompress runt knappen till exempel Skin X
<p>Saltbehandling</p>	<p>Använd finkornigt bordsalt utan tillsatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lägg på Xylocaingel 2% 5 minuter innan behandling. • Torka bort gelen. • Skydda huden runt stomat med hudbarriär till exempel vaselin, Cavilon • Lägg ca 1 kryddmått bordsalt på granulomet. Borsta bort eventuellt spill på kringliggande hud. • Täck med mjuk kompress så att saltet hålls kvar på granulomet i 10–30 minuter. • Tvätta därefter bort saltet noggrant med ljummet vatten. • Behandlingen upprepas 2 gånger/dag i 3 - 7 dagar.

Annat att tänka på vid granulom	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera knappens längd.• Ett ökat tryck mot granulomet kan hjälpa, prova en kortare knapp eller lägg kompress under knappen.• Ta bort matslangen mellan måltiderna.• Informera föräldrar om att det är viktigt att genomföra hela behandlingskuren.• Längre behandlingstid kan vara nödvändigt.• Om barnet ska sövas för något annat överväg eventuell diatermi.• Salva för hemorrojder kan hjälpa
---------------------------------	--

Behandling av granulom med kortisonkräm grupp 3

1g/dag i 7 dagar ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___

1 g/dag varannan dag i 2 dagar ___/___ ___/___

1 g/dag var tredje dag i 2 dagar ___/___ ___/___

Total behandlingstid 17 dagar

- Tvätta dagligen med tvål och vatten.
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär t.ex vaselin eller Cavilon.
- Lägg en kompress runt knappen och ta kräm med en bomullspinne och lägg en ”klick” under kompressen på granulomet.
- Underhållsbehandla vid behov med kräm 1-2g/vecka

Behandling av granulom med Kortison droppar, Grupp 3

1g/dag i 7 dagar:

___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___

- Tvätta dagligen med tvål och vatten
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär eller fet salva t.ex Vaselin eller Inotyol
- Droppa 3 droppar 2 ggr/dag i 7 dagar i stomat
- Behandlingen kan upprepas direkt ytterligare 7 dagar och ev. underhållsbehandling med 3 droppar 1 - 2 ggr/vecka.

Behandling av granulom med bordssalt

2 g/dag i 7 dagar:

___/___/___/___/___/___/___/___/___

- Lägg på Xylocaingel 2% 5 minuter innan behandling.
- Torka bort gelen.
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär t.ex vaselin, Cavilon
- Lägg ca 1 kryddmått bordsalt på granulomet. Borsta bort eventuellt spill på kringliggande hud.
- Täck med mjuk kompress så att saltet hålls kvar på granulomet i 10–30 minuter.
- Tvätta därefter bort saltet noggrant med ljummet vatten.
- Behandlingen upprepas 2 gånger/dag i 3 - 7dagar.

Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Verksamhet Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/Arbetsgrupp

Frida Kjellberg, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Område 1/SU, innehållsansvarig.

Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn, Verksamhet Barncancercentrum, Verksamhet AnOpIva neonatal barn, Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Frida Kjellberg, (frikj1), Barnsjuksköterska

Granskad av: Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-639

Version: 4.0

Giltig från: 2026-05-20

Giltig till: 2028-05-20