

Gäller för: Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn, Verksamhet  
Barncancercentrum, Verksamhet AnOplva neonatal barn, Barnhjärtcentrum  
Innehållsansvar: Frida Kjellberg, (frikj1), Barnsjuksköterska  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-17

Giltig till: 2027-02-14

# Behandling av granulom runt gastrostomi

## Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

## Sammanfattning

Behandlingsmetoder för granulom runt gastrostomi hos barn.

## Bakgrund och syfte

Att beskriva olika behandlingsmetoder för granulom runt gastrostomi hos barn. Ett granulom är en röd svulstig upphöjning som växer i eller runt stomat – svallkött. Granulomet kan vätska och vara lättblödande.



## Utförande

Granulom behandlas i första hand med grupp 3 steroider enligt ett schema. Antingen med salva alternativt med droppar. I andra hand används silvernitrat som man lapiserar med. I sista hand används kirurgisk åtgärd.

## Åtgärd

<p>Grupp 3 steroid; tex Elocon Kräm 0,1% eller Betnovat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total behandlingstid 17 dagar enligt schema, se nedan.</li> <li>• Rengör runt stomat med tvål och vatten.</li> <li>• Använd rikligt med salva.</li> <li>• Skydda frisk hud med hudbarriär, tex Cavilon.</li> <li>• Sätt en kompress runt knappen t.ex Skin X</li> </ul>
<p>Grupp3 steroid; droppar tex Elocon Kutan Lösning 0.1% 100ml eller Dexafree 0,1%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör runt stomat med tvål och vatten</li> <li>• Droppa 3 droppar Elocon i stomat morgon och kväll i 7 dagar.</li> <li>• Skydda den friska huden runt stomat med hudbarriär.</li> </ul>
<p>Lapis (silverniträt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedöva huden med Xylocaingel ca 5 minuter innan behandling.</li> <li>• Skydda den friska huden med hudbarriär, tex Cavilon.</li> <li>• Tryck (dutta) Silverniträtspinnen mot granulomet.</li> <li>• Täck området med en kompress.</li> <li>• Behandla var annan till var tredje dag, ca 3-4 tillfällen.</li> <li>• Eloconsalva kan med fördel läggas på efter behandling.</li> </ul>
<p>Annat att tänka på vid granulom</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera knappens längd. Tryck mot granulomet kan hjälpa, prova en kortare knapp eller lägg kompresser under knappen.</li> <li>• Ta bort matslangen mellan måltiderna.</li> <li>• Informera om vikten att genomföra hela behandlingskuren.</li> <li>• Längre behandlingstid kan vara nödvändigt.</li> <li>• Om barnet ska sövas för något annat överväg ev diatermi.</li> <li>• Salva för hemorrojder kan hjälpa.</li> </ul>

Grupp 3 steroid; tex Elocon Kräm 0,1% eller Betnovat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Total behandlingstid 17 dagar enligt schema, se nedan.</li><li>• Rengör runt stomat med tvål och vatten.</li><li>• Använd rikligt med salva.</li><li>• Skydda frisk hud med hudbarriär, tex Cavilon.</li><li>• Sätt en kompress runt knappen t.ex Skin X</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tvätta med Natriumklorid.</li><li>• Bikarbonat.</li></ul>

### Behandling av granulom med kortisonkräm grupp 3

1g/dag i 7 dagar \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_

1 g/dag varannan dag i 2 dagar \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_

1 g/dag var tredje dag i 2 dagar \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_

Total behandlingstid 17 dagar

- Tvätta dagligen med tvål och vatten.
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär t.ex vaselin eller Cavilon.
- Lägg en kompress runt knappen och ta kräm med en bomullspinne och lägg en ”klick” under kompressen på granulomet.
- Underhållsbehandla vid behov med kräm 1-2g/vecka

### Behandling av granulom med Kortison droppar, Grupp 3

1g/dag i 7 dagar:

\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_

- Tvätta dagligen med tvål och vatten
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär eller fet salva t.ex Vaseline eller Inotyol
- Droppa 3 droppar 2 ggr/dag i 7 dagar i stomat
- Behandlingen kan upprepas direkt ytterligare 7 dagar och ev. underhållsbehandlas med 3 droppar 1 - 2 ggr/vecka.

## Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Verksamhet Kirurgi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

## Granskare/Arbetsgrupp

Frida Kjellberg, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Område 1/SU, innehållsansvarig.

Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Medicin barn, Verksamhet Kirurgi barn, Verksamhet Barncancercentrum, Verksamhet AnOpIva neonatal barn, Barnhjärtcentrum

**Innehållsansvar:** Frida Kjellberg, (frikj1), Barnsjuksköterska

**Granskad av:** Frida Kjellberg, (frikj1), Barnsjuksköterska, Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare

**Godkänd av:** Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9774-1570060579-639

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-02-17

**Giltig till:** 2027-02-14