

Gäller för: Verksamhet Barncancercentrum

Giltig från: 2026-04-29

Innehållsansvar: Lene Karlsson, (lenkv1), Överläkare

Giltig till: 2028-04-16

Granskad av: Jenny Brühn, (jenbr33), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Thorsteinn Gunnarsson, (thogu14), Verksamhetschef

Anafylaktiska reaktioner vid avancerad barnsjukvård i hemmet

Förändringar sedan föregående version

Ändrat styrka för adrenalin intramuskulärt. Redaktionella ändringar.

Syfte

Rutinen syftar att vara ett stöd för bedömning och åtgärder i händelse av allergisk/anafylaktisk reaktion vid vård i hemmet av teamet för Avancerad barnsjukvård i hemmet.

Arbetsbeskrivning

I händelse av en allergisk/anafylaktisk reaktion ska sjuksköterskan, med stöd av denna rutin, göra en bedömning av graden av misstänkt anafylaxi och agera efter behandlingstabellen.

Sjuksköterskans bedömning samt uppgifter om vem som iordningställt och administrerat läkemedel samt tidpunkt ska dokumenteras i patientjournalen.

Om patienten har haft en läkemedelsreaktion i hemmet ska nästa ordinerad dos ges på sjukhus.

Bedömning

Vid misstänkt allergisk reaktion/anafylaxi orsakad av läkemedel:

- Avbryt eventuellt pågående medicinering
- Bedöm graden av misstänkt anafylaxi
- Agera efter behandlingstabellen

Bedöm graden av anafylaxi (1–3) enligt tabellen nedan. Symptom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan bedöms. Graden av anafylaxi bestäms utifrån det organsystem som uppvisar det/de allvarligaste symtomen.

Bedömningstabell

Diagnos	Hud	Ögon och näsa	Mun och mage/tarm	Luftvägar	Hjärta/kärl	Allmänna symtom
Ingen anafylaxi	Klåda Flush Urtikaria Angioödem	Konjunktivit med klåda och rodnad Rinit med klåda, nästäppa, rinnsnuva, nysningar	Munklåda läppsvullnad Svullnads-känsla i mun och svalg Illamående Lindrig buksmärta Enstaka kräkning			Trötthet
Anafylaxi Grad 1	Samma symtom som ovan	Samma symtom som ovan	Ökande buksmärta Diarré Upprepade kräkningar	Heshet Lindrig bronk-obstruktion		Uttalad trötthet Rastlöshet oro
Anafylaxi Grad 2	Samma symtom som ovan	Samma symtom som ovan	Samma symtom som ovan	Skällhosta Sväljningsbesvär Medelsvår bronk-obstruktion		Svimningskänsla Katastrofkänsla
Anafylaxi Grad 3	Samma symtom som ovan	Samma symtom som ovan	Urin- och/eller fecesavgång	Hypoxi, cyanos Svår bronk-obstruktion Andningsstopp	Hypotoni Bradykardi Arytmi Hjärtstopp	Förvirring Medvetslöshet

Behandlingstabell

Svårighetsgrad av anafylaxi	Behandling	Kontakt	Övervakning
Ingen anafylaxi men Överkänslighetsreaktion	<p>Tabl Desloratadin[®] 2.5/5mg per os</p> <p><6 år: 2.5 munsönderfallande 6-12 år: 5 mg ≥12 år: 10 mg</p> <p>Effekt inom 30–60 min</p> <p>Tabl Betametason[®] 0.5mg per os (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)</p> <p><6 år: 6 st ≥6 år: 10 st</p> <p>Full effekt efter 2–3 timmar</p>	Kontakta ansvarig läkare	Observation i hemmet, till sjukhus vid försämring
Grad 1	<p>Samma som ovan + Eventuellt Adrenalinpenna Intramuskulärt i lårets utsida.</p> <p>< 10 kg: Adrenalin 1 mg/ml. 0,01 ml/kg (= 0,01 mg/kg), Max 0,5 ml</p> <p>10–20 kg: EpiPen[®] 150 µg</p> <p>≥ 20 kg: EpiPen[®] 300 µg</p>	<p>Larma 112 för fortsatt behandling och skyndsam transport till sjukhus</p> <p>Tillkalla om möjligt kollega. Kontakta ansvarig läkare</p>	<p>I väntan på ambulans: -Om möjligt PVK -SaO2-övervakn. -Puls -Blodtryck</p> <p>Observation på sjukhus</p>
Grad 2	Samma som ovan	Samma som ovan	Samma som ovan
Grad 3	<p>Alltid adrenalin + FÖLJ HLR-RIKTLINJER VID ANDNINGS- OCH/ELLER HJÄRTSTOPP</p>	<p>Larma 112 för fortsatt behandling och omedelbar transport till sjukhus</p>	<p>Samma som ovan</p> <p>Omedelbar sjukhusvård</p>

Kontaktlista dagtid för sjukhusets enheter:

Akut korttidsavdelning, samordnare:	031-343 56 17
Medicinsk korttidsmottagning, samordnare:	031-343 51 12
Barncancercentrum, sektionsledare Snäckan	031-343 57 33
Barncancercentrum avd. 1, sektionsledare	031-343 66 53
Medicinavdelning barn, samordnare	031-343 56 80
Kirurgavdelning barn, sektionsledare	031-343 45 27
Medicinsk dagvård, sektionsledare	031-343 61 38

Ansvar

Gäller för personal på enheten Avancerad barnsjukvård i hemmet. Ansvar för spridning och implementering har avdelningschef. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvarig är ansvarig för revision. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl Pro.

Granskare

Katrin Adrian, Överläkare Medicin barn

Magnus Dahlander, Apotekare Barncancercentrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Barncancercentrum

Innehållsansvar: Lene Karlsson, (lenkv1), Överläkare

Granskad av: Jenny Brühn, (jenbr33), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Thorsteinn Gunnarsson, (thogu14),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-890

Version: 3.0

Giltig från: 2026-04-29

Giltig till: 2028-04-16