

Gäller för: Verksamhet AnOplva neonatal barn

Giltig från: 2025-02-18

Innehållsansvar: Karin Jonsson, (karjo20), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2030-02-18

Granskad av: Margrét Johansson Gudjonsdottir, (margu145), Sektionschef

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

ROP Retinopathy of prematurity

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

ROP drabbar i Sverige framför allt barn födda före gestationsvecka 30. Ju tidigare födsel desto större risk. Därför screenas alla barn som föds före v 30 rutinemässigt. Detta är den nationella riktlinjen.

Utförande

[Nationella guidelines ROP-revidering 16.12.2021](#)

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

[Ögonundersökning - stödande omvårdnad neonatal.pdf](#)

[Föräldrainsformation ROP - svenska](#)

[Föräldrainsformation ROP - engelska](#)

[Föräldrainsformation ROP - arabiska](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet AnOpIva neonatal barn

Innehållsansvar: Karin Jonsson, (karjo20), Barnsjuksköterska

Granskad av: Margrét Johansson Gudjonsdottir, (margu145),
Sektionschef

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-937

Version: 2.0

Giltig från: 2025-02-18

Giltig till: 2030-02-18