

Ögonoperationer pre- samt postoperativt omhändertagande

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Att tydliggöra rutinerna för pre- och postoperativ vård för barn < 3 mån och/eller < 5 kg som behöver opereras för katarakt, glaukom samt ROP.

Utförande

Barn som opereras för katarakt samt glaukom vårdas på Neonatalavdelning Östra både pre- och postoperativt.

Barn som opereras för ROP vårdas preoperativt antingen på Neonatalavdelning Östra eller Neonatal intensivvårdsavdelning Östra. Postoperativt initialt på Neonatal intensivvårdsavdelning Östra, med undantag för vissa barn som tas direkt till Neonatalavdelning Östra.

Barn som ska opereras för katarakt eller glaukom

Ledningsansvarig ssk får meddelande om planerad operation av avdelningschefen på ögonkliniken, Mölndal.

Ledningsansvarig ssk informerar LÖL Neo Östra.

Kanslist skickar kallelse till barnets föräldrar (gäller katarakt och glaukom pat). Behövs tolk i samband med inläggning?

Barnet ska komma för inskrivning dagen innan operation senast kl. 14.00 och stanna till f.m dagen efter operation. Familjerum bokas på Neonatalavdelning Östra. Broschyr-katarakt finns.

Inskrivningsdagen (dagen före operation)

- Sedvanlig inskrivning i Elvis (**vårdnivå V**) och Melior
- Inskrivs av neonatalläkare. Om barnet inte bedöms som friskt meddelas detta snarast till avdelningschef avd 237 ögon, Anette Erlandsson på telnr: 30615 alt. 0700 206 318 (går även att skicka sms om det är upptaget)

- Anestesi kontaktas för narkosbedömning. Telnr: 34702, ring så snart barnet kommit
- Ögonläkarundersökning (behöver inte beställas)
- Glukosinfusion ordinerar av ansvarig neonatalläkare

Barnets förberedelser

- ID-band
- Vikt och längd
- Preoperativt bad med Hibiscrub x 2. Akta ögon och öron.
- Barnet läggs i renbäddad säng med rena kläder efter bad 1
- PVK sätts och Hb kontrolleras under kvällen
- Anestesi journal fylls i.

På Operationsdagen

- Svält 4 timmar före operation, vilket i de flesta fall innebär från kl. 04.00. Om barnet är otröstligt kan man ge lite Algopedol. Koppla glukosinfusion enligt ordination.
- Tempkontroll på morgonen
- Rena kläder och blöja innan transport
- Kontrollera och signera operationslistan

Postoperativt

- Om barnet i övrigt är friskt räcker manuella kontroller av puls, resp, temp och saturation 1g/timme tills barnet vaknat, ätit och inte kräkts.
- Barn med underliggande sjukdom, tex BPD kan vara i behov av ytterligare övervakning enligt ordination av ansvarig läkare
- Mat kan ges då barnet vaknat
- Kontrollera att barnet kissat

Dagen efter operation- hemgång

- Utskrivning av ansvarig neonatalläkare
- Utskrivning av ansvarig ögonläkare
- Sedvanlig utskrivning i Melior och Elvis

Telefonnummer:

Anette Erlandsson, avdelningschef, avd 237 ögon
206 318

Telnr: 30615, 0700

Alf Nyström, överläkare ögon

Telnr: 30949

Barn som ska opereras för ROP

Inskrivningsdagen (dagen före operation)

- Sedvanlig inskrivning i Elvis (**vårdnivå V**) och Melior
- Ta reda på operationstid/svälttid
- Glukosinfusion ordinerar i pärmen av ansvarig neonatalläkare

Barnets förberedelser

- ID-band
- Vikt och längd
- PVK sätts och Hb kontrolleras under kvällen
- Anestesijournal fylls i

På Operationsdagen

- Svält 4 timmar före operation. Om barnet är otröstligt kan man ge lite Algedopol. Glukosinfusion kopplas enligt ordination
- Preoperativt bad, räcker med vanlig tvål
- Barnet läggs i renbäddad säng med rena kläder efter badet
- Tempkontroll på morgonen
- Rena kläder och blöja före transport till operation
- 1 droppe Cyklopentolat-fenylefrin APL 0,5% i varje öga 30 min före planerad operationstid och direkt vid transport till operation
- Kontrollera och signera Anestesijournalen
- Intubation sker på operation

Postoperativt

- Kontroller av puls, resp, temp och saturation 1g/timme tills barnet vaknat, ätit och inte kräcks
- Barn med underliggande sjukdom, tex BPD kan vara i behov av ytterligare övervakning enligt ordination av ansvarig läkare
- Mat kan ges då barnet vaknat, tidigare för barn med v-sond / i respirator
- Kontrollera att barnet kissat

Dagen efter operation/När barnet går hem

- Utskrivning av ansvarig neonatalläkare
- Sedvanlig utskrivning i Melior och Elvis

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet AnOpIva neonatal barn

Innehållsansvar: Cathrine Fransson, (catfr2), Vårdenhetschef

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-948

Version: 2.0

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-09-10