

Gäller för: Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus, Strålbehandling  
Sahlgrenska, Verksamhet Onkologi  
Innehållsansvar: Leif Klint, (leikl), Överläkare  
Granskad av: Leif Klint, (leikl), Överläkare  
Godkänd av: Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-13

Giltig till: 2028-05-13

# Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination inom vo onkologi

## Revideringar i denna version

Tillägg av läkemedel under rubriken antiemetika, smärta, infusioner samt överkänslighet. Tillägg också av ny rubrik, biverkan av Irinotekan. Snabbupprättande pga administrativ omstrukturering. Godkänt av VC Andreas Hallqvist.

## Arbetsbeskrivning

Ordination enligt generella direktiv skall ske med stor restriktivitet och bör omprövas regelbundet. Läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Given dos skall registreras med signum av sjuksköterskan på patientens läkemedelslista.

## Ansvar

Vårdenhetschefer och sektionschefer ansvarar för att rutinen blir känd bland läkare och sjuksköterskor.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Medicinskt ansvarig person på verksamheten

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i SOFIA STY, STY Cancersjukdomar SU.

Indikation	Läkemedel	Styrka	ml/st	Maxdos	Kontraindikation, biverkningar och ev. annan anmärkning
				Total dygnsdos	
<b>Antiemetika</b>	Inj Betapred iv	4 mg/ml	2 ml	2 gånger/dygn	Försiktighet vid diabetes
	Tabl Betametason	0,5 mg	8–16 st	2 gånger/dygn	Försiktighet vid diabetes
	Tabl Primperan	10mg	1 st	3 gånger/dygn	Extrapyramidala biverkningar. Antidot Akineton.
	Tabl Temesta	1 mg	1 st	2 gånger/dygn	Risk för tillvänjning, försiktighet vid bilkörning
	Ondansetron injektionvätska	2 mg/ml	4 ml	2 gånger/dygn	
	Tabl Zofran/Ondansetron	8 mg	1 st	2 gånger/dygn	
	Tabl Zofran/Ondansetron	4 mg	1-2 st	2 gånger/dygn	
	Akynzeo kapsel	300 mg/ 0,5 mg	1st	1 gång/dygn	
	Inj Palonosetron iv	250 ug	1 st	1 gång/dygn	
	Kapsel Aloxi	500 ug	1st	1 gång/dygn	
	Kapsel Emend	125 mg	1 st	1 gång/dygn	
	Kapsel Emend	80 mg	1 st	1 gång/dygn	
	Tabl. Olanzapin	2,5 mg	1st	1 gång/dygn	
<b>Diarré</b>	Kapsel/tablett Dimor	2 mg	1-2 st	1 gång/dygn	
<b>Förstoppning</b>	Supp Dulcolax	10 mg	1 st	1 gång/dygn	
	Rektallösning Microlax		1 st	1 gång/dygn	
	Movicol pulver till oral lösning		1dospåse	1-3 gånger/dygn	Ileus, inflammatoriska tarmsjd
	Mixt. Laktulos	670 mg/ml	20 ml	1 gång/dygn	Ileus
	Droppar Cilaxoral	7,5 mg/ml	10–15 droppar	1 gång/dygn	Ileus

Indikation	Läkemedel	Styrka	ml/st	Maxdos Total dygnsdos	Kontraindikation, biverkningar och ev. annan anmärkning
<b>Gastrit (mag-tarmbesvär)</b>	Kapsel Dimetikon	200 mg	1 st	3 gånger/dygn	
	Gaviscon	10 ml	1 st	3 gånger/dygn	
	Kapsel Omeprazol	20 mg	1 st	2 gånger/dygn	
	Tabl Ranitidin	150 mg	1-2 st	1 gånger/dygn	
	Tabl Ranitidin	300 mg	1 st	1 gång/dygn	
	Enterotablett Pantoprazol	20 mg	1 st	1 gång/dygn	
<b>Hostdämpande/slemlösande</b>	Brustabl Acetylcystein	200 mg	1 st	3 gånger/dygn	
	Mixt Cocillana- Etyfin		5-10 ml	3 gånger/dygn	
	Mixt Mollipect	0,5mg/ml+ 1 mg/ml	15 ml	3 gånger/dygn	
<b>Infusioner</b>	Inf Glukos buffrad	25 mg/ml	1 000 ml iv	1 gång/dygn	
	Inf Glukos buffrad (5%)	50mg/ml	1000 ml iv	2 gånger/dygn	
	Inf Natriumklorid	9 mg/ml	1 000 ml iv	1 gång/dygn	
	Inf Ringer- Acetat		1 000 ml iv	1 gång/dygn	
<b>Bedövande tex Katetersättning &amp; Underlivsmärtor</b>	Xylökain gel	2 %	1-2 doser	2 gånger/dygn	
<b>Kramper</b>	Stesolid rektallösning	10 mg	1 st	1 gång/dygn	
<b>Lungödem</b>	Inj Furix	10 mg/ml	4 ml	1 gång/dygn	
<b>Oro, klaustrofobi</b>	Tabl Oxascand	10 mg	1 st	2 gånger/dygn	Risk för tillvänjning
	Inj Stesolid Novum iv	5 mg/ml	0,5-1 ml	2 gånger/dygn	Risk för tillvänjning
	Inj Stesolid Novum iv	5 mg/ml	2 ml	1 gång/dygn	Inför MR undersökning, Risk för till vänjning.
	Tabl Stesolid	5 mg	1 st	2 gånger/dygn	Risk för tillvänjning

Indikation	Läkemedel	Styrka	ml/st	Maxdos Total dygnsdos	Kontraindikation, biverkningar och ev. annan anmärkning
<b>Smärta</b>	Inj Morfin sc	10 mg /ml	1 ml	2 gånger/dygn	
	Tabl Morfin	10 mg	1st	2 gång/dygn	
	Kapsel Oxynorm	5mg	1st	3 gånger/dygn	
	Kapsel Oxynorm	10mg	1st	3 gånger/dygn	
	Tabl Ibumetin	400mg	1st	3 gånger/dygn	
	Tabl Alvedon	500 mg	1-2 st	4 gånger/dygn	Försiktighet vid leverpåverkan.
	Supp Paracetamol	1 g	1 st	4 gånger/dygn	Försiktighet vid leverpåverkan
<b>Sömn</b>	Tabl Zopiklon	5 mg	1 st	1 gång/dygn	Grav leverinsufficiens
<b>Överkänslighet/Anafylaxi</b>	Medicinsk Oxygen	2-3 l på grimma		Läkare bör kontaktas vid O2-terapi > 20 min	Försiktighet vid astma, bleomycinbeh och KOL
	Adrenalin Autoinjektor (EpiPen) i första hand			Dos vuxna 0,3 mg	Intramuskulärt i lårets utsida
	I andra hand Inj Adrenalin 1mg/ml	1mg/ml		Effekt inom 5 min. Kan upprepas efter 5 min vb	
	Salbutamol	5 mg/ml		5-10 mg	Inhalation i nebulisator. Effekt inom 15 min. Upprepa vid vb
	Bricanyl Turbohaler inhalationspulver	0,5mg/dos	1-2 doser	3 doser/dygn	
	Inj Tavegil iv	1 mg/ml	2 ml	1 gång/dygn	
	Tabl Tavegil	1 mg	1 st	1 gång/dygn	
	Inj Solucortef iv	100 mg	100 mg	Dosen kan upprepas efter 15-20 min. Max 2 inj innan läkarkontakt	
	Inj Tavegil iv	2mg/2ml	1-2ml	2 gånger/dygn (=maxdos 4 mg/dygn)	Att använda när Tavegil inte finns tillgängligt
<b>Biverkan av Irinotekan</b>	Atropin iv	0,5mg/ml	0,5-1ml	1 gång/dygn	

.....  
 .....  
 Leif Klint, överläkare, läkemedelsansvarig

.....  
 Andreas Hallqvist, verksamhetschef

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus,  
Strålbehandling Sahlgrenska, Verksamhet Onkologi

**Innehållsansvar:** Leif Klint, (leikl), Överläkare

**Granskad av:** Leif Klint, (leikl), Överläkare

**Godkänd av:** Andreas Hallqvist, (andha16), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9775-406090012-124

**Version:** 15.0

**Giltig från:** 2026-05-13

**Giltig till:** 2028-05-13