

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2026-01-09

Innehållsansvar: Oskar Angerås, (oskan), Överläkare

Giltig till: 2027-04-30

Granskad av: Truls Råmunddal, (trura), Sektionschef

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

# Överkänslighet mot kontrastmedel, Intervention 2&3

## Revideringar i denna version

Årsrevidering

## Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att minska risken att fel och brister uppstår samt att underlätta introduktionen av nya medarbetare.

## Indikation

### **Patient med tidigare kontrastmedelsöverkänslighet**

- Vid anamnes på tidigare kontrastmedelsreaktion ska uppgift om reaktionens typ och grad samt typ av kontrastmedel eftersökas.
- Patienter med anamnes på urticaria, quinckeödem och bronkospasm vid kontrastmedelsexposition ska premedicineras.
- Patienter med anamnes på anafylaktoid reaktion/chock bör diskuteras med allergologkonsult och givetvis premedicineras.

### **Patienter utan känd kontrastmedelsöverkänslighet**

- Patienter med anamnes på allergi mot födoämnen t.ex. jordgubbar, skaldjur behöver inte premedicineras.
- Patienter med anamnes på allergi eller astma löper ökad risk för kontrastmedelsreaktion och kräver ökad uppmärksamhet. Dessa patienter ska ta sina ordinarie mediciner, men behöver i övrigt inte premedicineras.

## Läkemedel

T.Betametason (Betapred) á 0.5mg

Inj.Betametason (Betapred) 4mg/ml

T.Desloratadin (Caredin) 5mg (löses upp i munnen)

Inj. Tavegyl 1 mg/ml

## Metodbeskrivning

### Planerad undersökning

Kvällen före undersökningen eller ca. 12 timmar innan undersökning ges:

16 tabl. Betametason á 0.5mg alt Inj. Betametason 8mg i.v. och

2 tabl Desloratadin 5mg

Undersökningens morgon ges ytterligare: (minst 2-3 timmar innan us.)

16 tabl. Betametason á 0.5mg alt. Inj. Betametason 8mg i.v. och

2 tabl Desloratadin 5mg

### Akuta undersökningar

Vid akuta undersökningar/behandlingar då förbehandling ej är möjlig ges

Inj. Betametason 8mg i.v. samt 2 tabl Desloratadin 5mg

(munsönderfallande tablett) innan undersökningen.

**Vid allergisk reaktion kan T. Desloratadin po ersättas med Tavegyl 1mg/ml, 2 ml iv. Läkemedelt finns i läkemedelskåpet på i26.**

## Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs. Den sjuksköterska eller läkare som utför arbetsuppgiften är själva ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har rutinansvarig sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschef.

## Dokumentation

Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Oskar Angerås, Överläkare - VÖL, VO Thorax och Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Truls Råmunddal, Sektionschef Intervention, VO Thorax och Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Oskar Angerås, (oskan), Överläkare

**Granskad av:** Truls Råmunddal, (trura), Sektionschef

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9777-819499373-254

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2026-01-09

**Giltig till:** 2027-04-30