

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Giltig från: 2025-05-22

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1), Överläkare

Giltig till: 2027-05-21

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Revideringar i denna version

Inga.

Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att förebygga risker och tidigt identifiera brister. Samt underlätta introduktionen av nya medarbetare.

Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs.

Arbetsbeskrivning

GES ENBART PÅ LÄKARORDINATION

LÄKEMEDELS- BESKRIVNING

Trandate injektionsvätska 5mg/ml, flaska om 20 ml.
Aktiv substans i Trandate är labetalol. Utöver en oselektiv β -receptorblockerande effekt har labetalol en selektiv α 1-receptorblockerare.
Trandate sänker blodtrycket genom att minska det perifera motståndet och genom att minska stresshomonernas effekter på hjärtat.
Hjärtfrekvensen sänks mindre vid labetalolbehandling än med flertalet β -receptorblockerare
Maximal effekt nås oftast inom 5 minuter efter administrering. [FASS](#).

INDIKATIONER

Hypertoni

BIVERKNINGAR hudutslag

Hypotension, överkänslighetsreaktioner såsom rodnad, klåda, och dyspné. Förhöjda levervärden.

INTERAKTIONER

Verapamil v g se [FASS](#).

KONTRA- INDIKATIONER

Obstruktiv lungsjukdom, obehandlad hjärtinsufficiens och kardiogen chock, AV-block II och III samt sjuk sinusknuta.

SPÄDNING

Injektionsvätskan är bruksfärdig.

DOSERING

Normaldos 5 mg (1ml). Kan upprepas vid behov.

ADMINISTRERING

Långsam intravenös injektion, patienten skall ligga ner vid administrering.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras i avvikelssystemet Med Control Pro där aktuell linjeförordnad ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har avd 12-25 rutinansvarig tillsammans med vårdenhetschefen.

Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Kunskapsöversikt

[FASS](#).

Granskare/arbetsgrupp

Andreas Westerlind, Vårdenhetsöverläkare Thorax

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1),
Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-348

Version: 7.0

Giltig från: 2025-05-22

Giltig till: 2027-05-21