

Läkemedelsutsättning inför hjärtoperation.

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument 20241217

Sammanfattning

Dokumentet innehåller en beskrivning av vilka läkemedel som ska pausas, samt tidpunkt när detta görs inför hjärtoperation.

Bakgrund och syfte

Olika ingrepp i thorax innebär att läkemedel behöver sättas ut preoperativt och vid olika tidpunkter beroende på läkemedel. Dokumentet syftar till att klargöra och säkerställa vilka specifika läkemedel som detta gäller.

Förutsättningar

Se också.

[Checklista, preoperativa förberedelser inför thoraxingrepp för inneliggande hjärt-patienter](#)

Utförande

Varje enhets ansvar att kontrollera inför att patient ska förflyttas till thorax SU/S för hjärtoperation.

Tabell 1 beskriver med läkemedelsnamn och tidpunkter när vart och ett av läkemedlen ska sättas ut.

Utsättning av läkemedel vid ineliggande hjärtpatienter

Blodförtunnande mediciner pausas enligt följande innan operation:

- Brilique - **3** dagar innan operation
- Clopidogrel / Plavix / Grepid / Cloriocard – **5** dagar innan operation
- Eliquis - **3** dagar innan operation
- Lixiana - **3** dagar innan operation
- Pradaxa - **3** dagar innan operation
- Prasugrel / Efient - **7** dagar innan operation
- Waran - Målvärdet ska ligga under **1,8** (INR)
- Xarelto – **3** dagar innan operation

Inj Fragmin/Klexane tas sista dos på kvällen innan ingreppet, minst 12 h innan operationsstart. Alltså **ingen** dos på morgonen om man står på dubbeldos.

Trombyl / Acetylsalicylsyra - behålls fram till operationsdagen.

Hjärtmediciner pausas **2** dagar innan operation:

- Candesartan / Atacand / Candesarstad / Kairasec / Kandrozid
- Enalapril / Renitec
- Forxiga
- Irbersartan / Aprovel / Ifirmasta
- Jardiance
- Lisinopril / Zestril
- Losartan / Cozaar / Losarstad
- Ramipril / Triatec
- Valsartan / Entresto / Valsartore / Diovan

Diabetesmediciner pausas enligt följande innan operation:

- Metformin / Jardiance / Forxiga samt **all** annan diabetesmedicin i tablettform – pausas **2** dagar innan operation.
- Inj Victoza (liraglutid) eller andra dagliga injektioner, som inte är insulin – pausas **1** dag innan operation.
- Inj Ozempic (semaglutid), inj Trulicity (dulaglutid), inf Bydureon (exanatid), som tas veckovis - pausas **4** dagar innan operation.

Insulin används som vanligt.

Det långtidsverkande insulinet som tas till kvällen minskas till hälften kvällen innan operation.

Uppföljning

Uppdateras regelbundet.

Relaterad information

<https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-su-sty-hjart--och-karlsjukdomar-su/Delade%20dokument/CABG%20och%20klaff,%20preoperativ%20omvårdnad%20på%20avd%2012-25.docx>

Arbetsgrupp

Operationskoordinatorer Thorax

ÖL

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi, Arkiv och informationsstruktur

Innehållsansvar: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Granskad av: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-535

Version: 3.0

Giltig från: 2025-12-10

Giltig till: 2027-12-10