

Läkemedelsutsättning inför Lungkirurgi.

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument 2024-1 2-17

Sammanfattning

Dokumentet innehåller en beskrivning av vilka läkemedel som ska sättas ut, samt tidpunkt när detta görs inför lungoperationen.

Bakgrund och syfte

Beroende på ingrepp så behövs läkemedel sättas ut preoperativt för att inte påverka operationen och säkerheten för patienten. Dokumentet syftar till att klargöra och säkerställa vilka läkemedel som detta gäller.

Förutsättningar

Se också:

[Checklista, preoperativa förberedelser inför thoraxingrepp för ineliggande hjärt-patienter.docx](#)

Utförande

Varje enhets ansvar att kontrollera inför att patient ska överflyttas till thorax SU/S för lungoperation.

Tabell 1 benämner läkemedel och tidpunkter när de ska sättas ut preoperativt.

<i>Blodförtunnande mediciner pausas enligt följande innan operation:</i>	
Brilique – 5 dagar innan operation	
Clopidogrel/Plavix/Grepid/Cloriocard- 5 dagar innan operation.	
Eliquis- 3 dagar innan operation.	
Lixiana- 3 dagar innan operation.	
Pradaxa – 3 dagar innan operation.	
Prasugrel/Efient - 7 dagar innan operation	
Waran- Målvärdet ska ligga under 1,4 (INR)	
Xarelto – 3 dagar innan operation.	
Trombyl/Acetylsalicylsyra- behålls fram till operationsdagen.	

<i>Hjärtmediciner pausas 2 dagar innan operation:</i>	
Candesartan / Atacand / Candesarstad / Kairasec / Kandrozid	
Enalapril / Renitec	
Forxiga	
Irbersartan / Aprovel / Ifirmasta	
Jardiance	
Lisinopril / Zestril	
Losartan / Cozaar / Losarstad	
Ramipril / Triatec	
Valsartan / Entresto / Valsartore / Diovan	

<i>Diabetesmediciner pausas enligt följande innan operation:</i>	
Metformin / Jardiance / Forxiga samt all annan diabetesmedicin i tablettform - pausas 2 dagar innan operation.	
Inj. Victoza (liraglutid) eller andra dagliga injektioner, som inte är insulin – pausas 1 dag innan operation.	
Inj. Ozempic (semaglutid), inj. Trulicity (duaglutid), inf. Bydureon (exanatid), som tas veckovis 4 dagar innan operation.	
Insulin används som vanligt. Det långtidsverkande insulinet som tas till kvällen minskas till hälften kvällen innan operation.	

Uppföljning

Uppdateras regelbundet.

Arbetsgrupp

Op koordinatörer thorax

VÖL Thorax

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Maya Landenhed Smith, (maysm1),
Överläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-538

Version: 4.0

Giltig från: 2026-02-05

Giltig till: 2028-01-28