

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Granskad av: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-10

Giltig till: 2027-12-09

Läkemedelsutsättning inför elektrodextraktion

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument 2024-12-17

Sammanfattning

Dokumentet innehåller en beskrivning av vilka läkemedel som ska sättas ut, samt tidpunkt inför operation av elektrodextraktion.

Bakgrund och syfte

Beroende på kirurgiskt ingrepp så behövs läkemedel sättas ut pre-operativt för att inte påverka operation och säkerhet för patient. Dokumentet syftar till att klargöra och säkerställa vilka läkemedel som detta gäller.

Förutsättningar

Se också:

[Checklista, preoperativa förberedelser inför thoraxingrepp för ineliggande hjärt-patienter.docx](#)

Utförande

Varje enhets ansvar att kontrollera inför att patient ska överflyttas till SU/S för elektrodextraktion.

Tabell 1 Benämner läkemedel och tidpunkt när de ska sättas ut pre-operativt.

Blodförtunnande mediciner pausas enligt följande inför operation;	
T Brilique – 5 dagar innan operation	
T Clopidogrel/Plavix/Grepid/Cloriocard- 5 dagar innan operation	
T Eliquis-3 dagar innan operation	
T Lixiana-3 dagar innan operation	
T Pradaxa-3 dagar innan operation	
T Prasugrel/Efient-7 dagar innan operation	
T Waran-Målvärdet ska ligga under INR 1,8	
T Xarelto-3 dagar innan operation	
T Tromblyl/Acetylsalicylsyra-behålls fram till operationsdagen	
Inj Fragmin/Klexane tas sista dos på kvällen innan ingreppet, minst 12 h innan operationsstart	

Hjärtmediciner pausas 2 dagar innan operation;	
T Candesartan/Atacand/Candesarstad/Kairasec/ Kandrozid	
T Enalapril/ Renitec	
T Forxiga	

T Irbersartan/Aprovel/Ifirmasta	
T Jardiance	
T Lisinopril/Zestril	
T Losartan/Cozarr/Losarstad	
T Ramipril/Triatec	
T Valsartan/Entresto/Valsartore/Diovan	

Diabetesmediciner pausas enligt följande innan operation;	
T Metformin/Jardiance/Forxiga. Samt all annan diabetesmedicin i tablettform. Pausas 2 dagar.	
Inj Victoza (Liraglutid) eller andra dagliga injektioner som inte är insulin, pausas 1 dag innan.	
Inj Ozempic (Semaglutid), Inj Trulicity (Dulaglutid), Inf. Bydureon (Exanatid), som tas veckovis, pausas 4 dagar innan.	
Insulin tas som vanligt, förutom att det långtidsverkande insulinet halveras i dos kvällen innan operation.	

Uppföljning

Uppdateras regelbundet.

Relaterad information

[CABG och klaff, preoperativ omvårdnad på avd 12-25](#)

Arbetsgrupp

Operationskoordinatorer

Emma Hansson, Specialistläkare inom Thoraxkirurgi

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Thorax och kardiologi

Innehållsansvar: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Granskad av: Emma Hansson, (emmha12), Specialistläkare

Godkänd av: Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9777-819499373-540

Version: 2.0

Giltig från: 2025-12-10

Giltig till: 2027-12-09