

# Operationssnitt och sår med förbands teknik

## Förändringar sedan föregående version

Steril teknik inom 48 timmar efter operation

Snitt tvättat med Klorhexidin innan dusch, skall endast tvättas med tvål och vatten eller Natriumklorid.

### Innehållsförteckning

Operationssnitt och sår med förbands teknik.....	1
Förändringar sedan föregående version .....	1
Bakgrund och syfte .....	1
Utförande.....	2
Relaterad information .....	3
Arbetsgrupp .....	3

## Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att förebygga risker och

tidigt identifiera brister. Samt underlätta introduktionen av nya medarbetare.

## Utförande

Inom 48 timmar efter operationslut skall snitt läggas om sterilt. Efter dessa 48 timmar, är det ren rutin.

Dag 1-4; Om förband är mättat, med vätska eller läckage utanför Mepilexborder, ska det bytas ut. Tvätta snitt antingen sterilt eller beroende på tidaspekt, med Hibiscrub blandat med lite vatten eller med Klorhexidin lösning 2%.

Dag 4; Alla patienter duschar med förband och därefter tas det bort och snitt tvättas med Hibiscrub/Klorhexidinlösning 2%.

Om snitt är tvättat med Klorhexidin innan dusch, skall snitt endast tvättas med tvål eller Natriumklorid.

Torrt snitt=>Curaporeförband

Vid lite läckage=> Torra kompresser och Curaporeförband

Vid större läckage; Kompresserm absdyna och Mefix tejp. Eller Aquacel, kompresser och/eller absdyna fixerat med Mefix tejp.

Vid skör hud; Cavilon under förband

Resterade duschar under vårdtid; förband av och patient duschar med tvål och vatten. Omläggning enligt ovan.

Tvätteknik

Rena sår tvättas med ljummet vatten och inifrån och ut från snittet.

Infekterande sår tvättas först med ljummet vatten, utifrån och in.

Odling ska tas. Tvätta sedan med Hibiscrub/Klorhexidinlösning 2%.

Därefter 1 Hibiscrub per dag.

Suturborttagning

Dras med sax eller sutursax efter 12 dagar. Lyft upp suturen i knuten med pincett eller peang. Klipp av ena tråden under knuten och dra ut suturen. Sätt steristrrips vb. Förband.

#### Agraffborttagning

Tas bort med agraffång, varannan agraff på Dag 12 och resterande Dag 14. Sätt tång över agraffen, så den hakar fast. Knipsa till och lyft upp agraff. Sätt steristrrips vb. Curaporeförband under vårdtid. Kör tång i dekontaminatorn.

Avvikelse ska dokumenteras och rapportera i MedControl när avvikelse är av den graden.

## Relaterad information

[Sårbehandling enligt ren och steril rutin - Vårdhandboken](#)

## Arbetsgrupp

Sårgrupp

VÖL

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Thorax och kardiologi

**Innehållsansvar:** Maya Landenhed Smith, (maysm1),  
Överläkare

**Godkänd av:** Kristofer Skoglund, (krisk3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9777-819499373-571

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-11-12

**Giltig till:** 2027-11-10