

Gäller för: Verksamhet Infektion

Innehållsansvar: Aylin Yilmaz, (aylyi1), Sektionschef

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-05

Giltig till: 2028-05-28

# Hiv, smittspårning vid nyupptäckt hivinfektion

Denna rutin gäller för  
Infektion

## Ansvar

Aylin Yilmaz, överläkare

## Arbetsbeskrivning

Alla nyupptäckta fall med hiv ska smittspåras!

Om patienten tidigare testats negativ sträcker sig smittspårningen till 6 veckor före det provtagningstillfället. Om det inte finns något negativt test får den behandlande läkaren avgöra hur långt tillbaka i tiden det är rimligt att smittspåra.

Barn till mödrar med nyupptäckt hiv ska testas om modern inte har testats negativ efter avslutad amning.

Vissa individer som kommer för smittspårning av hiv skulle kunna vara aktuella för PrEP. De ska i sådant fall remitteras till Hud- och könsmottagningen, Sahlgrenska av ansvarig läkare.

## Delegation

- Behandlande läkare dikterar delegation om smittspårning till vederbörande kurator och skriver in detta i journalen. Den sekreterare som skriver diktatet skickar bevakning till den aktuella kuratorn, alternativt att behandlande läkare själv skickar bevakning till vederbörande kurator.

## Smittspårningens gång

- Kurator kallar indexpatienten omgående för smittspårningssamtal.
- Kontakterna kallas till samtal och provtagning. Detta görs i första hand via telefon.
- Kontakterna erbjuds tid för provtagning på Infektionsmottagningen och bokas då in i samråd med hiv-sjuksköterska på en tid. Kurator skriver en anteckning i Melior om att kontakten kallas för provtagning i smittskyddsutredning samt vilken diagnos det gäller. Provtagning av kontakter kan ske på annan mottagning än Infektionsmottagningen. Då behövs ingen anteckning i Melior.
- För att beakta indexpatientens rätt till anonymitet enligt Smittskyddslagen (SmL) uppges inte dennes identitet eller när smittotillfället förelegat till kontakterna.
- Efter provtagning får kontakterna i första hand en besökstid hos hivansvarig sjuksköterska på mottagningen. Besökstid hos läkare vid behov eller positivt prov.
- Kurator som ansvarar för smittspårningen antecknar start- och slutdatum för smittspårningen i Melior. Smittspårningsjournalen ska enligt SmL föras separat. Kodnummer anges i Melior samt i smittspårningsjournalen.

## Vid avslutad smittspårning

- När smittspårningen är avslutad tar ansvarig kurator kontakt med behandlande läkare för genomgång av smittspårningen.
- Smittspårningsjournalen ska signeras av behandlande läkare.

## Provtagning

- Combotest för hiv (hiv-antikroppar + hiv-antigen).
- Erbjud också provtagning för hepatit B och C (anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc) samt för klamydia, gonorré och syfilis.

## Uppföljning och utvärdering

Rutinen uppdateras vartannat år.

## Granskare

Åsa Mellgren, överläkare

Helena Gisslén, sjuksköterska

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Infektion

**Innehållsansvar:** Aylin Yilmaz, (aylyi1), Sektionschef

**Godkänd av:** Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9784-44644612-37

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-06-05

**Giltig till:** 2028-05-28