

Gäller för: Verksamhet Infektion

Giltig från: 2025-05-05

Innehållsansvar: Erika Tyrberg, (eriah2), Överläkare

Giltig till: 2027-05-05

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

HTLV - Smittspårning vid nyupptäckt infektion

Arbetsbeskrivning

Alla nyupptäckta fall med HTLV skall smittspåras.

Vilka ska provtas?

- Fast sexualpartner samt tidigare fasta partners.
- Barn till kvinnor med HTLV (om inte modern tidigare provtagits (negativ) efter att amning avslutats).
- Indexpatientens mor.
- Vid användning av intravenösa droger provtas sprutkontakter.

Om patienten tidigare testats negativ sträcker sig smittspårningen till två månader före det provtagningstillfället. Om det inte finns något negativt test får den behandlande läkaren och den som utför smittspårningen avgöra hur långt tillbaka i tiden det är rimligt att spåra.

Delegation

- Behandlande läkare dikterar delegation om smittspårning till vederbörande kurator. Behandlande läkare skickar bevakning till vederbörande kurator.

Smittspårningens gång

- Kurator kallar indexpatienten omgående för smittspårningssamtal.
- Kontakterna kallas därefter till samtal och provtagning. Detta görs i första hand via brev, i andra hand per telefon. Kurator gör en anteckning i Melior om att kontakten kallats för provtagning i smittspårningsutredning samt vilken diagnos det gäller. Det kodnummer som är kopplat till indexpatientens journal anges också.

- Provtagning av kontakter kan, av sekretesskäl eller om personen bor på annan ort, ske på annan mottagning än Infektionsmottagningen.
- För att beakta indexpatientens rätt till anonymitet enligt Smittskyddslagen (SmL) uppges inte dennes identitet eller när smittotillfället förelegat till kontakterna.
- Kurator kontaktar ansvarig sjuksköterska för provtagning av kontakter som kommer till Infektion. Sjuksköterska återkopplar provsvar till kurator när detta kommit.
- Efter provtagning får kontakterna i första hand en besökstid hos ansvarig sjuksköterska på mottagningen. Besökstid hos läkare vid behov eller vid positivt prov.
- Kurator som ansvarar för smittspårningen antecknar start- och slutdatum för smittspårningen i Melior. Smittspårningsjournalen ska enligt SmL föras separat. Kodnummer anges i Melior samt i smittspårningsjournalen.

Vid avslutad smittspårning

- När smittspårningen är avslutad tar ansvarig kurator kontakt med behandlande läkare för genomgång av smittspårningen.
- Smittspårningsjournalen ska signeras av behandlande läkare.

Provtagning

- HTLV-I/II-antikroppar

Uppföljning och utvärdering

Rutinen uppdateras vartannat år.

Granskare

Linn Renborg, specialistläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Infektion

Innehållsansvar: Erika Tyrberg, (eriah2), Överläkare

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9784-44644612-40

Version: 8.0

Giltig från: 2025-05-05

Giltig till: 2027-05-05