

Gäller för: Verksamhet Infektion

Giltig från: 2025-05-05

Innehållsansvar: Erika Tyrberg, (eriah2), Överläkare

Giltig till: 2027-05-05

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

HTLV-infekterade gravida kvinnor och deras barn

Arbetsbeskrivning

I samband med graviditet bör den gravida kvinnan kallas för läkaråterbesök under graviditeten.

Information ska ges om smittrisk vid förlossning och amning. Det ska poängteras att absolut störst transmissionsrisk är vid amning varför detta starkt avrådas ifrån. Risken för smittöverföring vid vaginal förlossning är mycket liten. Generellt rekommenderas ej sectio.

Sedvanlig provtagning enligt rutin.

Barnet

Provtagning sker vid 18-månaders ålder för HTLV-I/II-antikroppar.

Uppföljning och utvärdering

Rutinen revideras vartannat år.

Granskare

Linn Renborg, specialistläkare Infektion

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Infektion

Innehållsansvar: Erika Tyrberg, (eriah2), Överläkare

Godkänd av: Anna Grahn, (annpe88), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9784-44644612-41

Version: 6.0

Giltig från: 2025-05-05

Giltig till: 2027-05-05