

Gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra

Giltig från: 2025-01-09

Innehållsansvar: Jonas Bengtsson, (jonbe5), Överläkare

Giltig till: 2027-01-09

Granskad av: Jonas Bengtsson, (jonbe5), Överläkare

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Bäckenreservoar

Revideringar i denna version

Formatering fixad 2022-12-27

Reviderad 2020-04-14

- Förberedelser inför inläggning samt postoperativ vård som berör mat och dryck sker enligt rutin [ERAS – Enhanced Recovery After Surgery](#), doknr 9400 i Barium.
-
- Reservoarskopi samt återbesök till läkare utförs på kolorektallaboratoriet istället för på GEA och kirurgimottagningen.
-
- Postoperativ sårvårdsbehandling av tidigare stomihål enligt rutin [Postoperativ sårbehandling](#), doknr 10659 i Barium.
-
- Tagit bort delar kring operationsteknik under operation.
-
- Tillägg av Oralyt vid läkemedel.
- Tillägg loopileostomi:
[Stomiträning, undervisning och program för individuellt anpassad stomiträning](#), doknr 10185 i Barium.
- Patienten ska kunna hantera sin stomivård, annars VPL!
- Följande avsnitt har flyttats och lagts under loopileostomi:

Dag 3

Eventuell stav (mycket ovanligt) i loopileostomi avlägsnas.

Dag 7

Eventuell cystostomikateter (suprapubisk blåskateter; också mycket ovanligt) dras om inget annat har ordinerats.

- Tillägg omläggning:
Inspektera snittet dagligen, se Barium, 10659 [Postoperativ sårbehandling](#)
- Förskrivning av stomimaterial, egen rubrik efter läkemedel.
- Rutin för nedläggning loopileostomi
Preoperativt polikliniskt
Dag 10 Tobakspungsutur avlägsnas, remiss VC.

Arbetsbeskrivning

Indikation

Ulcerös colit eller FAP – familjär adenomatös polypos.

Operationsmetod

Utförs i första hand laparoskopiskt

Vårdtid

6 – 10 dagar.

Preoperativa åtgärder

Tarmförberedelser

Inga.

Mat och dryck

Enligt rutin [ERAS – Enhanced Recovery After Surgery](#)

Antibiotika och trombosprofylax

Ja, enligt rutin och ordination.

Blodbeställning

BAS-test

Övrigt

Stomiterapeut: Stomimarkering hos de patienter som inte har ileostomi.

Postoperativ vård

Mat och dryck

Enligt rutin [ERAS – Enhanced Recovery After Surgery](#)

Venprov

Dag 1 Hb, CRP, Na, K, Krea, därefter enligt ordination.

Övrigt

VIKT dagligen.

OBS! Inga suppositorier till dessa patienter p.g.a. risk för att skada anastomosen.

KAD

Urinmätning.

KAD dras efter att EDA tagits bort. Kontrollera resurin (<300 ml).

Loopileostomi

Observera färg(ska vara rosa-röd) på stomin och registrera ileostomivolymer.

Flöden över 1000 ml, ge kompensation.

[Stomiträning, undervisning och program för individuellt anpassad stomiträning](#)

Patienten ska kunna hantera sin stomivård, annars VPL.

Dag 3

Eventuell stav (mycket ovanligt) i loopileostomi avlägsnas.

Dag 7

Eventuell cystostomikateter (suprapubisk blåskateter; också mycket ovanligt) dras om inget annat ordinerats

Dränage

Vid dränage i buken mäts mängden varje dag och dras på läkarordination, vanligen dag 1.

Omläggning

Inspektera snittet dagligen, se [Postoperativ sårbehandling](#)

Suturer/Agraffer

Resorberbar tråd används i regel för stomisuturer.

Buksuturer ut dag 10 om inte patienten är suturerad intrakutant.

Smärta

Patienterna har i stort sett alltid EDA, var god se EDA-rutin.

Inför utskrivning

Utskrivningsplanering

Var god se checklista inför utskrivning på intranätet under område 2, Verksamhet kirurgi Östra, Rutiner och dokument, blanketter (kommer senare att flyttas till Sharepoint).

Om loopileostomi - remiss för reservoar-röntgen, och reservoarskopi på Kolorektallab.

Läkemedel

Recept på Loperamid samt Oralyt (vid stomiflöden)

Förskrivning av stomimaterial

Återbesök

Om loopileostomi - till stomiterapeuten om 2 veckor.

Till läkare efter 4 – 6 veckor på kolorektallaboratoriet med flexibel skopi av reservoaren.

CT med ingjutning för anastomoskontroll ska vara skriven och görs i samband med (eller före) återbesöket.

Sjukskrivning

1 – 2 månader.

Rutin för skötsel vid nedläggning (slutning) av loopileostomi efter bäckenreservoar

Preoperativt polikliniskt

- Reservoar-röntgen och reservoarskopi för att kontrollera den ileoanala anastomosen utförs på kolorektallaboratoriet 4 – 6 veckor postoperativt.

Postoperativt

- Sårvård av sårhåla efter stominedläggning enligt rutin [Postoperativ sårbehandling](#), doknr i Barium 10659.
- Patienten noterar antalet avföringar på ett avföringsschema.
- Huden runt anus kan skyddas med hudskyddande medel.
- Patienten ska ha mjukt toalettpapper, egen rulle.
- Loperamid ordinerar senast vid hemgång.

Dag 10

- Tobakspungsutur avlägsnas, remiss VC.

Lär patienten skydda huden runt anus. Tvätta först med vatten, baddtorka med mjukt toalettpapper och massera in hudskyddande salva.

Ansvar

Verksamhetschef, verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar. Samtlig personal på verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska delges direktivet via verksamhetschef, vårdenhetschef och enhetschef.

Uppföljning/utvärdering/revision

Sektionschef kolorektalsektionen, verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att detta dokument uppdateras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare

Monica Silebäck, avancerad specialistsjuksköterska avd 351, verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mattias Block, sektionschef kolorektalsektionen, verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Hallén, stomiterapeut, stomimottagningen, verksamhetsområde kirurgi, område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra

Innehållsansvar: Jonas Bengtsson, (jonbe5), Överläkare

Granskad av: Jonas Bengtsson, (jonbe5), Överläkare

Godkänd av: Malin Ragnmark Ek, (malek3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-168

Version: 8.0

Giltig från: 2025-01-09

Giltig till: 2027-01-09