OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi
Innehållsansvar: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef
Granskad av: Christian Jepsen, (chrje12), Överläkare
Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-12
Giltig till: 2028-08-12

Antikoagulantia inför operation

Syfte

Nedanstående tabell är tänkt att fungera som beslutsstöd och ersätter inte individuell bedömning av ansvarig plastikkirurg.

Bakgrund

Vid dagkirurgiska hudingrepp behöver i allmänhet inte profylaktisk acetylsalicylsyra i singelterapi (exv. Trombyl 75 mg) seponeras.

Hälsokostpreparat (exv. Omega 3, nyponpulver) sätts ut 2 veckor före operation.

	Substans	**Produkt**	**Utsätts före op**
Trombocyt-hämmare	Acetylsalicylsyra	Trombyl	12 h
	Acetylsalicylsyra (smärtbehandling)	Magnecyl, Aspirin, Treo, Bamyl	48 h
	Clopidogrel	Plavix	5 dygn
	Tikagrelor	Brilique	5 dygn
	Diklofenak	Diklofenak, Voltaren	12 h
	Ibuprofen	Ipren, Brufen, Ibumetin	12 h
Koagula tionshämmare	Apixaban	Eliquis	48 h
	Dabigatran	Pradaxa	48 h
	Rivaroxaban	Xarelto	48 h
	Warfarin (mål PK < 1,5)	Waran	5 dygn

Typ av antikoagulantia	**Produkt**	**Konvertera till** (”bridging”)	**När?**
Koagulationshämmare	Waran	Fragmin	5 dygn (via AK-mott SU/Ö)
Trombocythämmare	Plavix, Brilique	Lågdos ASA	7 dygn
	Högdos Trombyl	Lågdos ASA	3 dygn

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Ansvar

Alla läkare inom Verksamhet Plastikkirurgi, är ansvariga för utförandet av rutinens aktiviteter. Sektionschef bär ansvar för att denna rutin blir känd och ansvarar för att den efterlevs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Läkemedelscentrum ELINOR, Norrlands Universitetssjukhus (www.vll.se/lakemedelscentrum)

Fass för vårdpersonal (www.fass.se)

Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som

genomgår endoskopi, SGF Nationella riktlinjer, 2014

Granskare/arbetsgrupp

Öl Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum, SU/ Sahlgrenska.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Innehållsansvar: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Granskad av: Christian Jepsen, (chrje12), Överläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-52

Version: 6.0

Giltig från: 2026-08-12

Giltig till: 2028-08-12