

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Giltig från: 2026-04-02

Innehållsansvar: Johnna Sahlsten Schölin, (johsc1), Överläkare

Giltig till: 2028-04-02

Granskad av: Johnna Sahlsten Schölin, (johsc1), Överläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

# Barn – Läkemedel som får ges till barn utan särskild läkarordination

## Revideringar i denna version

Ordinationer uppdaterade i denna version

## Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa en god och patientsäker vård.

## Arbetsbeskrivning

Enligt SOSFS 2001:17 får läkemedel utdelas av sjuksköterska enligt *skriftliga generella direktiv*. Hon/han skall först själv göra en behovsbedömning. Ordination enligt generella direktiv skall ske med stor restriktivitet och bör omprövas regelbundet. Läkare skall ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Given dos skall registreras med signum av sjuksköterska på patientens läkemedelslista. Dosering sker alltid enligt Pediatrikt fickkompendium alt. ePed, aldrig enligt Melior:s rimlighetsbedömning (i läkemedelslista) då risk för överdosering finns.

För fullständig information om olika preparat, se ePed.

Läkemedel, läkemedelsform, styrka	Dos: enhet, volym	Antal gånger per dygn	Maxdos per dygn	Adm. sätt	Antal dygn utan läkar-kontakt	Anvisning med indikation, kontraindikation samt anmärkning
Paracetamol infusionsvätska, 10 mg/ml	15mg/kg Doserar i ml	4	Max 80mg/kg/dygn, dock max 4g/dygn	iv	2	<p><b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 2mån.</p> <p><b>Kontraindikation:</b> Ges ej vid leverpåverkan/leversjukdom. Kombinera ej med andra läkemedel innehållande Paracetamol.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Dosering enligt pediatrikt fickkompendium.</p> <p>Ges som infusion under 15 min (ok att ge på 5-20min).</p>

Alvedon tablett 250-500 mg	25mg/kg Doserar i mg	3-4	Max 100 mg/kg/dygn, dock max 4 gram/dygn	po	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 10kg <b>Kontraindikation:</b> Ges ej vid leverpåverkan/leversjukdom. Kombinera ej med andra läkemedel innehållande Paracetamol. <b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatriiskt fickkompendium.  Kan ges som filmdragerad tablett, munsönderfallande tablett eller brystablett.
Alvedon oral lösning 24 mg/ml	25mg/kg Doserar i ml	4	Max 100 mg/kg/dygn, dock max 4 gram/dygn	po	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 2mån. <b>Kontraindikation:</b> Ges ej vid leverpåverkan/leversjukdom. Kombinera ej med andra läkemedel innehållande Paracetamol. <b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatriiskt fickkompendium.
Alvedon suppositorium 60-500mg	25mg/kg Doserar i mg	4	Max 100 mg/kg/dygn, dock max 4 gram/dygn	rektalt	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 1mån. <b>Kontraindikation:</b> Ges ej vid leverpåverkan/leversjukdom eller till immunsupprimerade patienter. Kombinera ej med andra läkemedel innehållande Paracetamol. <b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatriiskt fickkompendium.  OBS: Supp rekommenderas ej i första hand.
Ipren tablett 200-400mg	40mg/kg/dygn Doserar i mg	3-4	Max 400 mg/dos, max 1200 mg/dygn	po	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 15kg. <b>Kontraindikation:</b> Ej vid blödningsbenägenhet, GI-blödningar, leverpåverkan/leversjukdom, njursjukdom, dehydrering, NSAID-känslighet. Kombinerar ej med andra NSAID-preparat. <b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatriiskt fickkompendium.
Brufen oral lösning 40mg/ml	3-5 mån 30mg/kg/dygn  >6 mån 40mg/kg/ dygn Doserar i ml	3	3-5 mån Max 30mg/kg/dygn  >6 mån Max 400 mg/dos, max 1200 mg/dygn	po	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 3mån. <b>Kontraindikation:</b> Ej vid blödningsbenägenhet, GI-blödningar, leverpåverkan/leversjukdom, njursjukdom, dehydrering, NSAID-känslighet. Kombinerar ej med andra NSAID-preparat. <b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatriiskt fickkompendium.
Ipren suppositorium 60-250mg	3-5 mån 30mg/kg/dygn	3-4	3-5 mån Max 30mg/kg/dygn	rektalt	2	<b>Indikation:</b> Smärta, till barn från 7kg.

	>6 mån 40mg/kg/ dygn  Doserar i mg		>6 mån Max 400 mg/dos, max 1200 mg/dygn			<p><b>Kontraindikation:</b> Ej vid blödningsbenägenhet, GI-blödning, leverpåverkan/ leversjukdom, njursjukdom, dehydrering, NSAID-känslighet, ej till immunsupprimerade patienter. Kombinerar ej med andra NSAID-preparat.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatrikt fickkompendium.</p> <p>OBS: Supp rekommenderas ej i första hand.</p>
Ondasetron injektionsvätska 2mg/ml	0,1 mg/kg/dos  Doserar i ml	3	Max 0,1 mg/kg x3, max 4 mg/dos.	iv	1	<p><b>Indikation:</b> Illamående/kräkning, till barn från 2år.</p> <p><b>Kontraindikation:</b> Ej vid nedsatt leverfunktion/ leversjukdom, hypokalemi, hypomagnesemi, till pat med bradykardi eller använder QT-förlängande läkemedel tex amitriptylin.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Dosering enligt pediatrikt fickkompendium. Ges som långsam injektion på 30 sekunder</p>
Ondasetron tablett 4-8mg	0,15 mg/kg	3	Max 0,15 mg/kg x3, max 8 mg/dos.	po	1	<p><b>Indikation:</b> Illamående/kräkning, till barn från 5år.</p> <p><b>Kontraindikation:</b> Ej vid nedsatt leverfunktion/ leversjukdom, hypokalemi, hypomagnesemi, till pat med bradykardi eller använder QT-förlängande läkemedel tex amitriptylin.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Ges i första hand intravenöst. Kan ges som filmdragerad tablett eller munsönderfallande tablett.</p>
Resulax	1 st	1	Max 1st/dygn	rektalt	1	<p><b>Indikation:</b> obstipation, till barn från 3mån</p> <p><b>Kontraindikation:</b> Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Till barn under 3 år ska bara halva tubspetsen föras in i ändtarmen.</p>
Desloratadin tablett 2,5mg-5mg	1 mån - 5 år: 2,5 mg  6 - 11 år: 5 mg  12 - 18 år: 10 mg  Doserar i mg	1	Engång dos	po	1	<p><b>Indikation:</b> Begränsad allergisk reaktion, till barn från 1mån.</p> <p><b>Kontraindikation:</b> Överkänslighet mot aktiva substans, mot något hjälpämne eller loratadin. Försiktighet hos patienter med medicinsk eller familjär historia av krampanfall.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Fast dosering enligt pediatrikt fickkompendium.</p> <p>OBS: Bör ej delas.</p>
Nezeril droppar 0,25 mg/ml	2-6 år: 2 droppar i vardera näsborre	2-3	2-6 år: Max 2 droppar i vardera näsborre x3/dygn	nasalt	1	<p><b>Indikation:</b> Rinit, nästäppa, avsvällande syfte vid sinuit, till barn från 2år.</p>

	7-10 år: 1 dosbehållare i vardera näsborre  Doserar i antal		7-10 år: Max 1 dosbehållare i vardera näsborre x3/dygn			<b>Kontraindikation:</b> Överkänslighet mot aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Ej till pat med atrofisk rinit eller rhinitis sicca.  <b>Anmärkning:</b> Högst 10 dagar i följd.
Nezeril droppar 0,5 mg/ml	Från 10år: 1 dosbehållare i vardera näsborre  Doserar i antal	2-3	Max 1 dosbehållare i vardera näsborre x3 per dygn	nasalt	1	<b>Indikation:</b> Rinit, nästäppa, avsvällande syfte vid sinuit, till barn från 10år.  <b>Kontraindikation:</b> Överkänslighet mot aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Ej till pat med atrofisk rinit eller rhinitis sicca.  <b>Anmärkning:</b> Högst 10 dagar i följd.

## Ansvar

All personal inom Verksamhet Plastikkirurgi, är ansvarig för utförandet av rutinens aktiviteter. Läkemedelsansvariga Plastikkirurgi bär ansvar för att denna rutin blir känd och ansvarar för att den efterlevs.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschef ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Sofia STYR. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Plastikkirurgi

**Innehållsansvar:** Johnna Sahlsten Schölin, (johsc1), Överläkare

**Granskad av:** Johnna Sahlsten Schölin, (johsc1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9785-1904528390-61

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-04-02

**Giltig till:** 2028-04-02