

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Giltig från: 2025-09-26

Innehållsansvar: Anna Larsson, (annla176), Övertandläkare

Giltig till: 2027-09-26

Granskad av: Anna Larsson, (annla176), Övertandläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Käckkirurgi, farmakologisk terapi vid käckkorrektiva ingrepp; plastikkirurg

Revideringar i denna version

Allmänna uppdateringar.

Syfte

Syftet är att säkerställa god och patientsäker vård för patienter som skall genomgå käckkorrektiva ingrepp vid Plastikkirurgiska kliniken.

Arbetsbeskrivning

Trombosprofylax

Låg risk	Ingen farmakologisk profylax
Medelhög risk	(BMI över 25 med risk för tromboembolism) Inj. Fragmin 5000 IE s.c. 3 timmar postoperativt, Därefter 5000 IE varje kväll kl. 20.00 tills patienten är fullt mobiliserad.
Hög risk	(Waranbehandlade pat., pat med hjärt- eller andningsinsufficiens, instabil angina, tidigare djupventrombos/lungembolism, malign sjukdom) Inj. Fragmin 5000 IE s.c 2 ggr/dag, därefter 5000 IE x2 varje kväll tills patienten är fullt mobiliserad.

Postoperativ svullnadsprofylax

Kvällen innan op ges tabl. Betapred 0,5 mg, 8 st.
Vid operationsstart ges inj. Betapred 8 mg iv.
Dagen efter op ges inj. Betapred 4 mg iv alt p.o, därefter på individuell indikation.

Antibiotikaterapi

Inj. Bensyl-pc (3g x3) eller Cloxacillin (2g x3) gives till vuxna och barn över 12 år, intravenöst med start vid induktion av anestesi. Därefter t. Kåvepenin 1 gx3 alt Heracillin 750 mg 1x3, beroende på kirurgisk entré.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Vid överkänslighet mot penicillin ges inj. Clindamycin (Dalacin) 600 mg x 3 iv.
Detta ges intravenöst 24 h postop, därefter peroralt tabl. Dalacin 300 mg x 3.

Smärtlindring

Peroperativt kan före op-slut inj. Dynastat 40 mg ges (om ej kontraindikation finnes) och Perfalgan 1g.

Första postoperativa dagen ges inj. Perfalgan 1g x 4 samt ev. tabl naproxen 500 mg x 2.

Perfalgan bytes mot t. Panodil 500 mg 2x4 v.b så snart pat kan svälja.

Ev. kan Ketogan alt. Morfin alt. tabl. Oxycontin v.b. tilläggas.

Ansvar

All personal inom VO Plastikkirurgi är ansvariga för rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver.
Sektionschef för plastikkirurgi bär ansvaret för att rutinen blir känd och efterlevs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetsöverläkare för Plastikkirurgi ansvarar för uppföljning och revision av innehållet av rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskad av

Anna Larsson, specialist i käkkirurgi

Dokumentation

Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Plastikkirurgi

Innehållsansvar: Anna Larsson, (annla176), Övertandläkare

Granskad av: Anna Larsson, (annla176), Övertandläkare

Godkänd av: Peter Apelgren, (petap1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9785-1904528390-86

Version: 8.0

Giltig från: 2025-09-26

Giltig till: 2027-09-26