

# Förlossningsrädsla handläggning, VGR

## Tillägg av lokala rutiner Östra skrivna med grön text

### Revideringar i denna version

**2025-02-17** Tillägg av lokala rutiner på obstetrike Östra, SU, skrivna i grönt.

**2025-03-04** Mindre revidering under rubrik "Rädsla för förlossning med önskan om kejsarsnitt", punkt 1.

## Bakgrund

*Riktlinjen avser förutom kvinnor andra personer som planerar graviditet eller är gravida.*

Normal oro inför sin förlossning är något de flesta kvinnor känner, men ungefär en fjärdedel kan känna mer än bara oro vilket då bedöms som "förlossningsrädsla". Svårare förlossningsrädsla är ett komplext tillstånd med skiftande ursprung och varierande grad och förekommer hos ca 10–15 % av alla gravida i Sverige. Förlossningsfobi finns hos ca 2–5%. Förlossningsrädsla är vanligare hos gravida med annan psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Förlossningsrelaterad PTSD förekommer hos upp till 4% av kvinnor med tidigare förlossning (1).

För de allra flesta gravida kvinnor räcker det med ett gott omhändertagande av barnmorskan på den barnmorskemottagning (BMM) där patienten är inskriven. Ibland behövs ett kompletterande

omhändertagande inom en verksamhet eller mottagning som är specialiserad på förlossningsrädsla, s k Auroramottagning.

Det är viktigt att upptäcka förlossningsrädsla tidigt i graviditeten för att kunna bedöma grad av rädsla samt initiera och planera insatser (2).

Förlossningsrädsla kan klassificeras som *primär* eller *sekundär*;

- *Primär förlossningsrädsla* innebär att den finns innan kvinnan föder sitt första barn
- *Sekundär förlossningsrädsla* uppkommer efter en tidigare svår förlossningsupplevelse.

Förlossningsrädsla klassificeras också utifrån hur stark eller svår den är;

- *Mild-måttlig rädsla* innebär en oro som kvinnan kan hantera själv eller med visst stöd och är en oro där kvinnan kan släppa tankarna på den förestående förlossningen under perioder.
- *Svår förlossningsrädsla och förlossningsfobi* innebär rädsla som ger ett psykiskt illabefinnande som väsentligen stör kvinnans vardagsliv, välbefinnande och sömn.
- *Förlossningsrelaterad posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)* kan uppkomma efter traumatisk förlossningsupplevelse/erfarenhet och definieras som en förlängd reaktion som har innefattat upplevelsen av hot om död eller skada mot sig själv eller närstående/barnet. Förlossningsrelaterad PTSD uttrycks i form av förhöjd ångest med återupplevelser av händelsen, ständiga försök att undvika det som associeras med traumat och ihållande symtom på överspändhet.

## Syfte

Syftet är en regiongemensam riktlinje för patienter med förlossningsrädsla med målet att erbjuda likvärdig vård och underlätta samarbete över verksamhetsgränser.

## Mål för vård avseende förlossningsrädsla

Bland patienter med förlossningsrädsla utgör svår förlossningsrädsla, förlossningsfobi och förlossningsrelaterad PTSD ett mer komplext tillstånd med många orsaker. Dessa patienter behöver ett individuellt

omhändertagande, ofta av ett multiprofessionellt team med kunskap och erfarenhet av att hantera förlossningsrädsla, så kallat Aurorateam med tillgänglighet året runt.

### **Mål för vården kring förlossningsrädsla**

- Att förstå och utforska hur kvinnans rädsla ter sig och vad den kan bero på
- Att genom samtal förbereda kvinnor med förlossningsrädsla inför födandet, och därigenom öka möjligheten till en positiv förlossningsupplevelse oavsett förlossningssätt.
- Att ge kvinnan och hennes partner ökad kunskap om förlossningsprocessen
- Att avdramatisera och ge en realistisk bild av födandet
- Att stärka kvinnans tro och tillit till sin egen förmåga
- Att ge möjlighet att bearbeta en tidigare förlossningsupplevelse (8)

## Utförande

### Aurorateam för förlossningsrädda

För att kunna möta gravida kvinnor med förlossningsrädsla behöver kvinnosjukvården erbjuda ett team, en specialistmottagning för förlossningsrädda, oftast kallad Auroraverksamhet eller Auroramottagning. Detta team bör bestå av erfarna barnmorskor och obstetiker/Mödrahälsovårds-(MHV)läkare (specialist inom gynekologi och obstetrik) med kunskap inom förlossningsrädsla. Teamet bör ha regelbunden och återkommande tillgång till psykolog för diskussion kring olika patientärenden och för handledning.

Teammöte inom Auroraverksamheten s k Aurorarond eller section rond/konferens utgör grund för beslut kring förlossningssätt i komplexa fall, t ex då patienten önskar elektivt kejsarsnitt utan medicinsk indikation och då vården bedömer att kejsarsnitt inte är ett

likvärdigt förlossningsalternativ till vaginal förlossning ur ett medicinskt perspektiv.

För att säkerställa en jämlik vård samverkar Aurorateamen genom gemensamma träffar för kunskapsinhämtning, reflektionsutbyte och utvärdering av Auroraverksamheterna. Aurorateamet bör också kunna erbjuda kunskapsutbyte och reflektion tillsammans med övriga barnmorskor/läkare inom kvinnoklinikens upptagningsområde samt inom närliggande områden.

## Handläggning

Patienten erbjuds en personcentrerad vård av god kvalitet i hela vårdkedjan (graviditet, förlossning och eftervård) i enlighet med [Basprogram för Mödrahälsovården VGR](#) (9) för graviditet med tillägg av extra stöd och samtal.

Barnmorska på BMM efterfrågar den gravidas inställning till förlossning och barnafödande för att identifiera och gradera förlossningsrädsla. Förlossningsrädslan kartläggs vidare genom samtal för att kunna erbjuda stöd och behandling på rätt nivå.

Fear of Birth-skattningsskala (FOBS) kan användas från graviditetsvecka 16 och är ett verktyg för bedömning och skattning av förlossningsrädsla. Skalan går från 0 till 100, där 60 poäng eller högre räknas som utfall för förlossningsrädsla (7).

Omhändertagande vid förlossningsrädsla bör starta tidigt i graviditet och avslutas inte förrän vid andra eftervårdsbesöket. Ytterligare uppföljande besök eller ett senare samtal inför kommande graviditet kan erbjudas. Se rekommendation: Erbjud stöd och behandling vid förlossningsrädsla - Socialstyrelsen (3).

Barnmorska på BMM/patientansvarig barnmorska (PAB) följer upp patientens behov av stöd genom hela graviditeten, även då patienten remitteras till Auroraverksamhet. Samarbetet mellan vårdinstanserna är viktigt för att patienten ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Läkare inom MHV/specMVC kontaktas vid behov av

konsultation eller besök under graviditeten. I svåra fall bör patientansvarig läkare (PAL) utses.

Psykolog från Psykologmottagningar för föräldraskap och små barn (PFOSB) erbjuder regelbunden konsultation kring svåra fall och kan bistå barnmorskan i bedömning av graden av förlossningsrädsla.

Psykologkontakt kan vara aktuell vid måttlig till svår förlossningsrädsla, vid behov i samverkan med Auroraverksamhet.

Remiss/hänvisning till psykolog kan vara en god hjälp särskilt i de fall patienten uttrycker behov av stöd i föräldrablivandet.

## Vårdnivå

### **Patient med;**

- lätt till måttlig förlossningsrädsla behandlas inom MHV/BMM med stöd av läkare inom MHV/SpecMVC vid behov.
- måttlig-svår förlossningsrädsla där mödrahälsovårdens stöd blir otillräckligt och med behov av *förlossningsplanering* remitteras av PAB eller läkare inom MHV/specMVC för handläggning på Auroramottagningen. Samverkan sker med PAB/BMM och vid behov psykolog PFOSB.
- svår förlossningsrädsla/förlossningsfobi kan konsulteras med psykolog inom PFOSB och/eller övervägas för tidigt samråd med läkare inom MHV/specMVC. Patienten remitteras vidare efter bedömning och samtal till Auroramottagningen, enligt lokal rutin.
- sekundär svår förlossningsrädsla med tidigare genomgången kejsarsnitt kan handläggas av läkare inom MHV/specMVC med specialistkompetens i samarbete med Auroraverksamheten enligt lokal rutin.

### **Remiss till Aurora - tidpunkt:**

- Remiss till Aurora skickas efter RUL.
- I särskilda fall skickas remiss av läkare till Auroraverksamhet efter TUL men före RUL, såsom t ex vid svår primär/fobisk förlossningsrädsla/PTSD eller svår sekundär förlossningsrädsla.

### **Remiss till Aurora bör innehålla:**

- BPU
- Tidigare förlossnings sätt om omföderska
- Grad av förlossningsrädsla
- Anamnes inkl övriga sjukdomar, läkemedel och anledning till rädsla
- Ambivalens runt förlossnings sätt alternativt uttalad önskan om kejsarsnitt
- Önskan om vaginal förlossning med plan
- Insatser som påbörjats via BMM

Vid "Utomlänsremiss" se Riksavtal utomlänsvård (10)

### **Samverkan**

Gravida med förlossningsrädsla kan behöva insatser samtidigt från flera professioner och olika vårdgivare och instanser kan behöva samordnas. Samtycke inhämtas från den gravida för att kontakt mellan instanserna ska initieras. Professionellt informationsutbyte av väsentlig information är ofta en fördel för att optimera insatser. Den gravida ska inte behöva agera "budbärare" mellan olika instanser.

### **Rädsla för förlossning hos icke-gravid patient**

Patienter med svår förlossningsrädsla/fobi utan tidigare förlossning, som **inte** är gravida omfattas av prekonceptionell rådgivning och information.

Lokal rutin Östra: Primär svår/fobisk förlossningsrädsla hos icke gravid kan erbjudas prekonceptionell kontakt via egenremiss till Auroramottagningen Östra.

Psykologisk behandling kan rekommenderas via annan vårdgivare än PFOSB.

Patienter med sekundär förlossningsrädsla och som inte är gravida kan erbjudas samtal hos MHV-läkare/ läkare specMVC eller samtal vid Auroraverksamhet utifrån rädlans karaktär och orsak. Dessa patienter erbjuds då en möjlighet att gå igenom tidigare förlossning och förlossningsupplevelse. Planerad postpartumuppföljning efter svår förlossningsupplevelse kan verka förebyggande mot sekundär förlossningsrädsla inför en ny graviditet och förlossning.

### **Rädsla för förlossning utan önskan om kejsarsnitt**

Mild till måttlig rädsla handläggs på BMM och i första hand av PAB, vid behov i samråd med läkare. PAB sammanfattar önskemålen i graviditetsvecka 35. Vid behov kan en sk *förlossningsplan* upprättas i mödrahälsovårds/förlossningsjournal av Aurorabarnmorska, MHV-läkare eller läkare SpecMVC.

Måttlig till svår förlossningsrädsla *kan* handläggas inom ramen för BMM i samråd med läkare och psykolog PFOSB, men kan också remitteras för fortsatt omhändertagande till Auroraverksamhet. *Förlossningsplan* ska vara tydligt markerad i journal och skrivs i samråd med patienten.

**Lokal rutin Östra: Förlossningsplan som upprättas inom MHV och som innehåller medicinska interventioner (ex låg tröskel för sectio eller induktion) skickas till Auroraronden för förankring. Planen förs då in i patientens förlossningsjournal.**

Svår förlossningsrädsla-fobi handläggs via Auroraverksamhet för möjlighet till upprepade samtal och planering av förlossning och postpartumtid.

Sekundär förlossningsrädsla med tidigare kejsarsnitt och önskan om vaginal förlossning, handläggs av PAB i samråd med MHV-läkare/läkare specMVC alt Aurora.

### **Rädsla för förlossning med önskan om kejsarsnitt**

1. Patient med svår förlossningsrädsla och önskan om kejsarsnitt bedöms enligt lokal rutin av MHV-läkare/läkare SpecMVC inför remiss till Aurora alternativt av Aurorateamet efter remiss från barnmorska MHV.

**Lokal rutin Östra: Vid förlossningsrädsla och önskan om sectio bokas pat till MHV-läkare för bedömning, samtal och information (undantag tidigare e-sectio på psykosocial indikation, se flödesschema). Vid fortsatt önskemål om sectio eller behov av utökat stöd skickas remiss till Auroramottagningen.**

Syftet med besöket är att fördjupa anamnes, göra en individuell bedömning av patientens förutsättningar för en vaginal förlossning

och informera om olika alternativ samt om det stöd som kan ges via Auroraverksamheten. Beslut om kejsarsnitt på indikation förlossningsrädsla bör tas inom ramen för Auroras teammöten där barnmorska och obstetriker alltid ingår. Beslut om förlossningssätt och förlossningsplan överlämnas efter teammöte till patienten och ansvarig PAB/BMM informeras. Teammötet s k Aurorarond/sectionond/sectiokonferens utformas enligt lokala förutsättningar. I särskilda fall fattar obstetriker på kvinnoklinik med vana av arbete med förlossningsrädda beslut om förlossningssätt. Detta kan ske då det finns behov av snabb bedömning t ex vid långt gången graviditet.

2. Vid svår förlossningsrädsla/fobi hos patient med tidigare trauma/sexuella övergrepp och/eller PTSD-diagnos bör samtal starta tidigt i graviditeten med stor lyhördhet för patientens sårbarhet. Förlossningsplan med elektivt kejsarsnitt *kan* övervägas redan vid inledande läkarsamtal om det finns anamnes av sexuellt övergrepp/våld eller PTSD diagnos.

**Lokal rutin Östra: Vid svår förlossningsrädsla/fobi hos patient med tidigare trauma/sexuella övergrepp och/eller PTSD-diagnos remitteras efter läkarsamtal i MHV till Auroramottagningen för fortsatt omhändertagande.**

3. Patient bör vid svår rädsla/fobi även efter beslut om kejsarsnitt erbjudas fortsatt stöd via Auroraverksamhet.
4. Patient med sekundär förlossningsrädsla och med tidigare kejsarsnitt handläggs inom ramen för Auroraverksamhet alternativt på BMM med läkarbesök inom MHV/läkare SpecMVC när kompetens finns, enligt lokala förutsättningar ([länk till lokal riktlinje Östra = Bilaga 1 flödesschema](#)). Genomgång av tidigare förlossning med fokus på vad som orsakat bestående rädsla är viktig del av samtalet. Vid kvarstående önskan om kejsarsnitt efter läkarbesök och individuell rådgivning kan beslut om kejsarsnitt tas av läkare på förlossningsklinik. Remiss skrivs till Auroraverksamhet om patienten behöver mer stöd än det som kan erbjudas på BMM.

5. Omfödelskor med både vaginal förlossning och kejsarsnitt utgör en grupp som behöver individuell bedömning och bör därför handläggas via Auroraverksamheten.
6. För patient med tidigare elektivt kejsarsnitt pga förlossningsrädsla och kvarstående önskan om kejsarsnitt kan remiss skickas av PAB till förlossningsenhet för direkt beslut om elektivt kejsarsnitt. Patienten förutsätts vara välinformerad om risker med upprepade kejsarsnitt.

I allmänhet så kan det vid behov av extra stöd, oavsett förlossningssätt, skickas remiss till Auroraverksamhet för till exempel fysiskt besök på förlossningsenheten som del av förberedelse inför förlossning.

*Alla patienter som planeras för kejsarsnitt bör förberedas och erbjudas förlossningsplan utifall förlossning startar spontant före graviditetsvecka 37+0.*

### **Vid beslut om elektivt kejsarsnitt pga förlossningsrädsla bör nedan beaktas:**

- Paritet
- Tidigare kejsarsnitt
- PTSD-diagnosticerad före graviditet inom allmänmedicin eller psykiatri.
- Tidigare sexuella övergrepp eller våld
- Förlossningsfobi, med fördröjd graviditet
- Psykiatrisk samsjuklighet
- Ålder
- BMI
- Övriga sjukdomar, läkemedel, tidigare bukoperationer och hereditet.

**Elektivt kejsarsnitt** bokas i graviditetsvecka 39 för att minska risken för andningsstörning hos barnet. Patienten informeras om att beslutet gäller från gv 37+0 men kan omvärderas vid spontan start med snabbt förlopp. Vid prematur förlossningsstart (före gv 37+0) rekommenderas vaginal förlossning, om inte obstetriska kontraindikationer för vaginal förlossning föreligger eller uppkommit.

## Uppföljning av patientens upplevelse/utfall av handläggning inom Aurora

Uppföljning av kvinnor med förlossningsrädsla bör ske på varje kvinnoklinik och inom mödravården. Aurorateamet ansvarar för uppföljning i de fall patienten haft kontakt med Auroraverksamhet. Uppföljningen planeras årligen.

## Regional samordning

Möten inom Västsverige (VGR och Halland) ska ske årligen.

### Fokus är;

- Fortbildning och samordning.
- Genomgång av kvalitetsparametrar/variabler
- Uppföljning och patientutvärdering
- Patientflöden mellan olika verksamheter uppmärksamma

### ICD-diagnoser relevanta vid förlossningsrädsla

- Z 91.8 Förlossningsrädsla
- F41.8 Andra specificerade ångesttillstånd
- F41.9 Ångest, ospecificerat
- F43.1 Posttraumatiskt stresstillstånd
- F32.9 Depressiv episod, ospecificerad

## Referenser:

1. [Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn \(sbu.se\)](#)
2. [Uppmärksamma förlossningsrädsla - Socialstyrelsen \(2023-12-18\)](#)
3. [Erbjud stöd och behandling vid förlossningsrädsla - Socialstyrelsen \(2023-12-18\)](#)
4. [Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet \(sbu.se\) \(2021-02-25\)](#)
5. [Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet \(sbu.se\)](#)
6. [Förlossningsrädsla - 1177](#)
7. [fobs-sve.pdf \(karolinska.se\)](#)
8. [www.SFOG.se](#)  
Nätupplaga; [1005623\\_A2fb46497-d45b-466d-8126-c58e99fe856d.pdf \(sfog.se\)](#)
9. [Basprogram för Mödrahälsovården VGR \(vgregion.se\)](#)
10. [Riksavtal-utomlansvard-rev23-lankar.pdf \(skr.se\)](#)



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Obstetrik

**Innehållsansvar:** Susanna "Sanna" Nygren, (susny9),  
Överläkare

**Granskad av:** Erica Ginström Ernstad, (erigi2), Sektionschef

**Godkänd av:** Anneli Falk, (annfa17), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9786-1429723585-395

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-03-04

**Giltig till:** 2027-03-04