

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Avdelning 19 och 32 medicin- och lungavdelning  
Innehållsansvar: Annika Arthursson, (annar42), Vårdenhetschef  
Granskad av: Peter Hällgren Nordhage, (petha34), Specialistläkare  
Godkänd av: Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-28

Giltig till: 2027-01-28

# Avdelning 19–32 – Pleuraspolning med klorhexidin

## Förändringar sedan föregående version

Rutinens rubrik ändrad från AMGS ... till Avdelning 19–32. Ändringar införda under Förberedelser, material och Utförande, tillvägagångssätt.

## Bakgrund och syfte

Denna rutin syftar till god och patientsäker vård i samband med pleuraspolning.

## Förutsättningar

Sjuksköterskor och undersköterskor med delegering för uppgiften på medicin- och lungavdelning 19–32, verksamhet Akutmedicin och Geriatrik, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för arbete enligt rutinen.

Ansvar för spridning och implementering har vårdenhetschefen medicin- och lungavdelning 19–32.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Avgränsningar

**Indikation:** Utförs endast efter läkares ordination

Pleuraempyem.

## Förberedelser

Informera patienten om varför behandlingen görs och hur den utförs.

## Material

- Klorhexidin, spolvätska 0,2 mg/ml
- Natriumklorid 9 mg/ml
- Spruta 20 ml
- Oliv (koppling mellan spruta och drän)
- Kateterpropp och klämman
- Handskar
- Förkläde.

## Utförande

### Tillvägagångssätt

- Ta på dig handskar och plastförkläde.
- Klampa dränet och koppla bort uribag.
- Kontrollera att det inte läcker bredvid dränslangen genom att spola in NaCl 9 mg/ml, cirka 20 ml.
- Koppla sprutan med klorhexidin till dränet.
- Öppna dränet och spruta in spolvätskan.
- Klampa dränet med klämman och propp, låt vara stängt i 20 minuter om inte läkaren ordinerat annan tid.
- Om inte läkare angivit annat spolas dränet efter 20 minuter med NaCl enligt Rutin "Pleuraspolning med natriumklorid (NaCl). Börja med att aspirera ut spolvätskan.

## Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

## Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdenhetschef för medicin- och lungavdelning 19–32 eller av denne utsedd person.

## Relaterad information

Relaterad lokal medicinsk rutin: Pleuraspolning med natriumklorid (NaCl).

## Arbetsgrupp

Framtagen av: Lotta Dahlquist, sjuksköterska, Lungmedicin avd 19, Vo  
Geriatrisk lungmedicin och allergologi, Område 6, Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset

Denna version reviderad av: Johanna Eller, sjuksköterska/sektionsledare,  
Medicin- och lungavdelning 19–32, verksamhet Akutmedicin och  
geriatrik, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Verksamhet Akutmedicin och geriatrik, Avdelning 19 och 32 medicin- och lungavdelning

**Innehållsansvar:** Annika Arthursson, (annar42),  
Vårdenhetschef

**Granskad av:** Peter Hällgren Nordhage, (petha34),  
Specialistläkare

**Godkänd av:** Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9788-135611145-121

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-01-28

**Giltig till:** 2027-01-28