

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-02-20

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-02-13

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

# DIAGN – Pleurodes – omvårdnadsrutin

## Förändringar sedan föregående version

Ändringar gjorda under rubriken Material. Verksamhetsnamn korrigerat.

## Bakgrund och syfte

Beskrivning för att pleurodes utförs på ett säkert sätt.

## Förutsättningar

Rutinen gäller för Lungdiagnostisk mottagning, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där sjuksköterskor ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Avgränsningar

### Indikation

Malign pleurit och pneumothorax.

## Förberedelser

- Informera patienten.
- Basala hygienrutiner tillämpas.

## Utrustning

- 4–6 st 50 ml sprutor.
- 2–4 st rosa kanyl 1,2 X 50 mm
- Spolvätska NaCl 9 mg/ml
- Läkemedel för pleurodes.

- Dränförband.
- Ev sterilt sammanbindningsrör
- Ev 3 vägskran + swanlock propp
- Ev steril kateterpropp.
- 1 st plastat underlägg.
- Ev steril sax (vid behandling på vårdavdelning).
- Descutansvamp.

## Utförande

### Tillvägagångssätt

- Placera plastat underlägg i sängen
- Avlägsna drän förbandet
- Läkaren kontrollerar dränets läge och funktion genom att spola 20–30 ml NaCl i slangen, inget läckage får uppstå.
- Det ordinerade läkemedlet instilleras och därefter spolas dränet med 20–40 ml NaCl beroende på dränets tjocklek.
- Dränet klampas via trevägskran/ kateterklämma /kateterpropp

**OBS!** Om läckage uppstår runt slangen under instillationen skall proceduren avbrytas och slangen efterspolas med minst 40 ml NaCl. Läkemedlet är starkt vävnadsretande.

### Skötsel/omvårdnad

- Tvätta med Descutansvamp samt lägg på nytt förband.
- Informera att feber/ smärta kan uppstå
- Klampat drän samt fritt sänkläge i 2 timmar.
- Dränet öppnas efter 2 timmar, var god se Medicinsk rutin (ska skickas med till avdelningen)

### Komplikation

- Feberreaktion. (Indikation på önskad effekt)
- Smärta. (Indikation på önskad effekt)
- Vävnadsskada i huden av läkemedlet.

### Instrumentvård

- Ev. flergångsmaterial rengörs i diskdesinfektorn, därefter till sterilisering
- Engångsmaterial slängs.

## Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjeförord ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

## Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdenhetschefen eller av denne utsedd person.

## Relaterad information

Medicinsk rutin DIAGN – Pleurodes

## Arbetsgrupp

Framtagen av: Jeanette Sundberg, sjuksköterska och Eva Erriahi, undersköterska, Lungdiagnostisk mottagning

Denna version reviderad av: Mia Johansson, sjuksköterska, Lungdiagnostisk mottagning.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

**Granskad av:** Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9788-135611145-123

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-02-20

**Giltig till:** 2028-02-13