

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,
Allergimottagning Sahlgrenska
Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25

ASIT – SLIT (sublingual immunterapi) Behandlingsstart och uppföljning vid behandling med Grazax

Förändringar sedan föregående version

Rutinen är anpassad till mall i STY Sharepoint. Förändrad information receptföreskrivning samt Relaterad information med länk tillagd.

Bakgrund och syfte

Enhetlig rutin vid start av sublingual immunterapi med Grazax.

Förutsättningar

Läkare och sjuksköterskor inom Allergimottagningen, verksamhet Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef och vårdenhetschef öppenvården ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Avgränsningar

ALK Grazax 75 000 SQ-T Phlenum pratense (timotej)

Utförande

Behandlingsstart

Rekommenderad tid för behandlingsstart är cirka 4 månader innan gräspollenssäsongen.

Sjuksköterskan kallar från SLIT-väntelista. Ge tid för start per telefon eller brev och lägg meddelande till PAL om att skriva recept.

Före besök behandlingsstart:

- Läkare skriver recept på tabl Grazax 75 000 SQ-T för en månad.
- Patienten hämtar ut tabletterna och tar med till behandlingsstarten.

Vid besök behandlingsstart:

- Patienten fyller i Blankett ”Utvärdering av allergisymtom före start med GRAZAX®” och lämnar till sjuksköterskan. Blanketten framtagen av ALK och finns på Allergimottagningen.
- Gå igenom ”Checklista patient – Start av GRAZAX®” och fyll i tillsammans med patienten. Blanketten framtagen av ALK och finns på Allergimottagningen.
- Blankett ”Utvärdering av GRAZAX® behandling” lämnas till patienten. Patienten ska fylla i blanketten och skicka till Allergimottagningen efter pollensäsong. Blanketten framtagen av ALK och finns på Allergimottagningen.
- Behandlingen pågår i 3 år
- Tablett tas lämpligen före frukost dagligen
- Vid glömska tag den så fort som möjligt, **samma dag**
- Tablett är ömtålig och går lätt sönder, skall tas direkt
- Under första minuten bör patienten undvika att svälja och dessutom inte äta och dricka inom 5 minuter
- Patienten stannar på mottagningen 30 minuter efter att tablett placerats under tungan.
- Eventuella biverkningar noteras
- Boka telefontid i samråd med patienten för kontakt 2–3 veckor efter behandlingsstart. lämna med blankett ”Utvärdering av GRAZAX® behandling”, som patienten ska fylla i och skicka till Allergimottagningen efter pollensäsong. Blanketten framtagen av ALK och finns på Allergimottagningen.

Biverkningar:

- Mycket vanliga är klåda och svullnad i munnen, irritation i halsen, nysningar, öronklåda
- Övrigt se FASS text
- Symtomen kommer tidigt och pågår några minuter till timmar
- Försvinner spontant efter 1–7 dagar

Behandling av biverkningar:

- Antihistamin en tablett vid behov eller eventuellt förebyggande innan SLIT

Behandlingen startas ej vid:

- Feber och tecken på infektion
- Astmaförsämring
- Allergiska reaktioner
- Skada i munhålan till exempel blåsor, kirurgi, tandextraktion
- Graviditet

Pågående behandling

- Tänk på att göra ett uppehåll i 7 dagar vid behandling av sjukdom i munhålan, tandextraktion mm

Första kontakt efter behandlingsstart

- Sjuksköterska tar telefonkontakt 2–3 veckor efter start för bedömning av behandlingen och eventuella biverkningar.
- Sjuksköterskan kontaktar PAL för nytt recept angående fortsatt behandling. Läkaren skriver recept för 1 år, det vill säga 90 st à 4 uttag.
- Sjuksköterskan sätter upp patienten på planeringslista för telefonkontakt med medicinskt måldatum efter utvärdering av första pollensäsong efter behandlingsstart.

Uppföljning

- Efter första och andra pollensäsongen skickar patienten in ”Utvärdering av GRAZAX® behandling”. När PAL har fått ifylld blankett förnyar PAL recept för 1 år (90 st à 4 uttag). Eventuellt telefonkontakt innan. När receptet utfärdats skickar PAL även standardbrev med frågeformulär för säsong 2 respektive säsong 3 (”Utvärdering av GRAZAX® behandling”).
- Efter 3 år behandlingsavslut och utvärdering av effekt. Därefter i regel utremittering till primärvården, kan göras via telefon alt. läkarbesök beroende på behov.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i

MedControlPRO, där aktuell linjeförord ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

Relaterad information

ALK Nordic a/s, (länk) <https://alkpro.se/>

Arbetsgrupp

Rutinen framtagen av: Monica Arvidsson, Överläkare allergologi, Kerstin Löfdahl, Överläkare, Yvonne Bäckberg, sjuksköterska, Yvonne Andersson, sjuksköterska.

Denna version reviderad av: Maria Petersen, vårdenhetschef Allergimottagning, Mona Palmqvist, Överläkare allergologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,
Allergimottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Granskad av: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare, Elisabet
Löfdahl, (elilo4), Överläkare

Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-141

Version: 8.0

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25