

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Allergimottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2025-10-22

Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Giltig till: 2027-10-10

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

# Allergologi – Vaccinationer allergologi

## Förändringar sedan föregående version

Rutinen är uppdaterad.

## Bakgrund och syfte

Vaccination sker vid allergologen på medicinsk indikation för ”riskpatienter”. Övriga patienter hänvisas till vaccinationsmottagningar. Som riskpatienter definieras lungsjuka med optimalt FEV<sub>1</sub> 1,0 efter beta-2 <50 % av förväntat värde eller pO<sub>2</sub> <8,0. Här är det framför allt aktuellt med vaccin mot luftvägsinfektioner (till exempel influensa, pneumokock, haemofilus, covid-19).

Vaccination kan också utföras vid allergologen med annat vaccin där misstanke om tidigare allergisk reaktion på vaccin föreligger men av medicinsk ansvarig allergiläkare bedömts kunna ges enligt specifik ordination.

Det är den medicinskt ansvarige läkaren som bedömer vilka patienter som skall vaccineras.

## Förutsättningar

Läkare och sjuksköterskor inom Allergimottagning Sahlgrenska, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschef ansvarar för att rutin finns och följer gällande författningar/lagar.

## Utförande

Rester efter ägg och kycklingprotein kan finnas i influensavaccinet, vilket i allmänhet inte ger några problem.

Enligt nuvarande rekommendationer från regional Terapigrupp Vaccin (länk under rubrik Relaterad information) talar nuvarande evidensläge starkt för att äggallergi inte ökar risken för allergiska reaktioner mot influensavaccin. Barn över sex månader och vuxna kan vaccineras med influensavaccinet enligt gängse rutiner i primärvård förutsatt att inga andra riskfaktorer föreligger. Undantag görs i Sverige för de få barn och vuxna som haft verifierad anafylaxi mot ägg och sjukhusvårdats för detta. Dessa bör bedömas vid allergologisk specialistmottagning.

Ovan gäller även vid vaccination mot MPR och TBE.

Vid vaccination mot gula febern gäller extra försiktighet, var god se länk nedan Terapiråd Vaccination vid äggallergi.

Det är lämpligt att alla vaccinationer på allergologen övervakas minst 30 minuter, eftersom alla är bedömda som ”riskpatienter”. Speciell ordination om övervakning ska finnas för vaccin vid misstanke om risk för allergisk reaktion.

Recept skrivs ut och patienten hämtar själv ut vaccinet på apoteket till självkostnadspris. Besöket debiteras enligt gällande taxa, högkostnadsskyddet gäller ej vid enbart vaccinering. Ges vaccinationen i samband med läkarbesök, ingår vaccinationen i avgiften och högkostnadsskyddet gäller som vanligt.

## Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjeförordning ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

## Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

## Relaterad information

[Terapiråd Vaccination vid äggallergi 2024 VGR](#)

## Arbetsgrupp

Rutinen framtagen av Janne Björkander, överläkare.

Denna version reviderad av: Mona Palmqvist, Överläkare allergologi, Allergimottagning Sahlgrenska.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Specialistmedicin, Allergimottagning  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Mona Andersson Palmqvist, (monpa7),  
Överläkare

**Granskad av:** Maria Petersen, (marwa43), Vårdenhetschef,  
Karin Rahm, (karra1), Sektionschef

**Godkänd av:** Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9788-135611145-164

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2025-10-22

**Giltig till:** 2027-10-10