

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,
Allergimottagning Sahlgrenska
Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25

ASIT – Instruktioner för underhållsbehandling med ALK Alutard pollen, kvalster, pälsdjur, bi och geting

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar sedan föregående version.

Bakgrund och syfte

Instruktioner för underhållsbehandling med ALK Alutard pollen, kvalster, pälsdjur, bi och geting vid ASIT.

Förutsättningar

Läkare och sjuksköterskor, Allergimottagningen, verksamhet Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef och vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Utförande

Depåextrakt (ALK Alutard)

Lämpligt tidsintervall 6 ± 2 veckor

Dosändring vid långt tidsintervall

Tid från föregående injektion:

9–12 veckor ge 1/2 av senaste dos

13–16 veckor ge 1/4–1/10 av senaste dos

>16 veckor börja om/ompröva indikation

Dosändring på grund av reaktion efter föregående injektion (både snabb och senreaktion)

Svullnad 5–10 cm oförändrad dos

Svullnad \geq 10 cm gå ner 1–2 dossteg

Vid lindrig allergisk allmän reaktion

till exempel rinit som går över
med en antihistamintablett gå ner 1–2 dossteg

Vid måttlig allergisk allmänreaktion

till exempel generell urtikaria ge 1/4–1/10 av senaste dos

Vid svår allmänreaktion

ompröva indikationen

Efter lokal reaktion eller allmän reaktion som föranlett dosreduktion bör fortsatt behandling ske enligt uppdoseringsschemat.

Under säsong sänks aktuell dos till hälften. Uppdosering görs i 2 steg med 2–6 veckors intervall. Observera dock att om patienten har pågående allergisymtom så ska uppdosering, oavsett allergen, avvaktas tills symtomen är under kontroll. Detta innebär t ex att uppdosering bjrök avvaktas till efter grässäsong.

Efter bi- eller getingstick vänta en vecka med ny dos.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

Arbetsgrupp

Rutinen hämtad från lokal Metodbok.

Denna version reviderad av: Mona Palmqvist, Överläkare allergologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,
Allergimottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

Granskad av: Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare, Elisabet
Löfdahl, (elilo4), Överläkare

Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-18

Version: 8.0

Giltig från: 2024-04-25

Giltig till: 2026-04-25