

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,  
Allergimottagning Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare  
Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-12

Giltig till: 2026-12-12

# ASIT – Riktlinjer för uppdosering med ALK Alutard pollen, kvalster, pälsdjur, bi och geting

## Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar sedan föregående version.

## Bakgrund och syfte

Instruktioner för uppdosering med ALK Alutard pollen, kvalster, pälsdjur, bi och geting vid ASIT.

## Förutsättningar

Läkare och sjuksköterskor Allergimottagningen, verksamhet Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschef och vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Utförande

### Depåextrakt (ALK Alutard)

- Uppdosering med 1 - 2 veckors intervall.
- Vid uppdosering med monoallergen Björk och Gräs, se separat schema.

**Dosändring** vid långt behandlingsintervall, tid från föregående injektion:

3–4 veckor	oförändrad dos
5–6 veckor	ge 1/2–1/4 av senaste dos
>6 veckor	börja om/ompröva indikation.

**Dosändring** på grund av reaktion efter föregående injektion, omfattar både snabb och senreaktion (inom 24 timmar):

Svullnad	5–10 cm	oförändrad dos
Svullnad	>10 cm	gå ner 1–2 dossteg

Vid lindrig allergisk allmän reaktion, till exempel rinit som går över med en Antihistamintablett gå ner 1–2 dossteg

Vid måttlig allergisk allmänreaktion, till exempel generell urtikaria, ge 1/4–1/10 av senaste dos.

Vid svår allmänreaktion ompröva indikationen.

### **För pollen**

Ingen dosökning under säsong, tidsintervall 3–4 veckor, med senast givna dos innan säsong eller max 100 000, 0,5 ml. Uppdosering av eventuellt andra allergen avvaktas tills samtliga för patienten aktuella säsonger är över.

Efter säsong eller annat tillfälligt avbrott fortsatt uppdosering med 1–2 veckors intervall.

### **För bi/geting**

Efter eventuellt bi- eller getingstick, vänta en vecka med ny dos.

Slutdosen anpassas individuellt.

Immunterapi startas ej vid graviditet och uppdosering avbryts.

## **Avsteg från rutin**

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

### **Uppföljning**

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

## **Relaterad information**

Vid uppdosering med monoallergen Björk och Gräs, se separat schema.

# Arbetsgrupp

Rutinen hämtad från Metodboken, lokal instruktion Allergimottagningen.

Reviderad av: Monica Arvidsson, Överläkare allergologi

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin, Allergimottagning Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Mona Andersson Palmqvist, (monpa7),  
Överläkare

**Godkänd av:** Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9788-135611145-20

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2024-12-12

**Giltig till:** 2026-12-12