

Gäller för: Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,  
Allergimottagning Sahlgrenska  
Innehållsansvar: Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-04-26

Giltig till: 2026-04-26

# ASIT – Uppdoseringsschema för immunterapi med ALG Geting Alutard och Geting Aquagen

## Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar sedan föregående version.

## Förutsättningar

Läkare Allergologi, verksamhet Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Sektionschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

## Utförande

| Behandlings-<br>följd | Koncentration<br>SQ/ml | Volym ml | Mängd SQ |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|
| 1                     | 100                    | 0,1      | 10 (x/)  |
|                       | 1 000                  | 0,1      | 100      |
|                       | 10 000                 | 0,1      | 1 000    |
|                       | 10 000                 | 0,3      | 3 000    |
| 2                     | 10 000                 | 0,5      | 5 000    |
| 3                     | 100 000                | 0,1      | 10 000   |
| 4                     | 100 000                | 0,2      | 20 000   |
| 5                     | 100 000                | 0,4      | 40 000   |
| 6                     | 100 000                | 0,65     | 65 000   |
| 7                     | 100 000                | 1        | 100 000  |
| 8                     | 100 000                | 1        | 100 000  |
| 9                     | 100 000                | 1        | 100 000  |

(x/) sätt alltid i v nål vid behandling 1 vid start av immunterapi och ge med 30 min intervall.

Injektionen 1 - 8 ges med en veckas mellanrum.

OBS! Mellan dos 8 och 9 skall det vara 2 veckors intervall, därefter  $6 \pm 2$  veckors intervall som underhållsbehandling (gäller Alutard).

Vid underhållsbehandling med Aquagen ges injektionerna var 4:e  $\pm 1$  vecka.

## Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

### Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

## Arbetsgrupp

Reviderad av: Monica Arvidsson, Överläkare allergologi.

Denna version reviderad av: Mona Palmqvist, Överläkare allergologi.

## Källförteckning

Modifierat efter Lichtenstein et al 1979, J Allergy Clin Immunol, (1979;64:5-12)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Lungmedicin allergologi och palliativ medicin,  
Allergimottagning Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Mona Andersson Palmqvist, (monpa7), Överläkare

**Granskad av:** Monica Arvidsson, (monar3), Överläkare, Elisabet  
Löfdahl, (elilo4), Överläkare, Mona Andersson Palmqvist, (monpa7),  
Överläkare

**Godkänd av:** Charlotte Widell, (chawi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9788-135611145-23

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-04-26

**Giltig till:** 2026-04-26