

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Giltig från: 2025-08-27

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Giltig till: 2027-08-26

Granskad av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Ventrikeltömnings-skintigrafi, info till remittent

Denna rutin gäller för

Verksamhet Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Undersökningsindikation/Syfte

Undersökning av magsäckens tömningsfunktion.

Kontraindikation

Graviditet och amning.

Annan nuklearmedicinsk undersökning två dygn före den aktuella.

Allergi mot ägg eller mjölkprotein.

Förberedelser

Patienten ska vara svältande, icke rökande/icke snusande sedan klockan 24.00. Mediciner kan tas som vanligt.

Tillvägagångsätt

Dynamisk bildtagning omedelbart efter intag av en måltid bestående av ^{99m}Tc-märkta pannkakor med ev sylt på.

Tidsåtgång

Måltid: ca 15 minuter

Bildtagning: Efter måltiden läggs patienten under kameran i 2 timmar

Önskade remissuppgifter

Frågeställning med relevant sjukdomshistoria.

Aktuell medicinering.

Eventuell gluten- eller laktosintolerans.

För **generell remittentinformation**, gå till hemsidan www.vgregion.se/klinfys_vgr

Ansvar

Metodansvarig läkare på klinisk fysiologi.

Uppföljning, utvärdering och revision

Dokumentansvarig administrativ person ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i administrativt system om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskad av

Anna Dudás, VÖL

Viktor Lysell, Sektionsledare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Anna Dudás, (anndu10), Överläkare

Granskad av: Jesus Lopez Urdaneta, (jeslo10), Sektionschef

Godkänd av: Per Nivedahl, (perda7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9800-1516193980-252

Version: 10.0

Giltig från: 2025-08-27

Giltig till: 2027-08-26