

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-06-03

Innehållsansvar: Magdalena Koniarska, (magko3), Specialröntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-06-03

Granskad av: Ivan Cetinic, (ivace1), Specialistläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Tunntarms- och Kolonpassage röntgenundersökning

Remittent information

Undersökningen utförs på

Radiologi Östra, Radiologi Mölndal och Radiologi Sahlgrenska

Indikation

Misstänkt mekanisk ileus (tunntarmshinder)

Förberedelser

Inför bildtagning dricker patienten (eller får via sonden) kontrast som hämtas på radiologi. Därefter skall patienten ligga på sin högra sida de första 2h.

Första bildtagning sker enligt rutin 6 timmar efter kontrastintaget om inget annat angivits av en radiolog i prioriteringen.

Tillvägagångssätt

Bildtagning sker sedan för att följa kontrastpassagen genom tunntarmarna. Patienten kommer till röntgen oftast flera gånger med tidsintervall som bestäms av en granskande radiolog.

Eftervård

Dricka rikligt med vätska för att skölja rent tarmen, om patienten inte blir föremål för operation.

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Magdalena Koniarska, (magko3),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Ivan Cetinic, (ivace1), Specialistläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1154

Version: 8.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03