

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Therése Larsson, (thela6), Undersköterska

Granskad av: Hanna Fogel, (hanfo6), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Giltig från: 2026-09-03

Giltig till: 2028-08-28

Ultraljud Sklerosering, injektion av läkemedel, Radiologi Mölndal

Us kod/Us namn 964621D/964621S – ULJ armbåge, sklerosering höger/vänster
969621D/969621S – ULJ knäled, sklerosering höger/vänster
~~981621D/981621S – ULJ hälsena, sklerosering höger/vänster~~

Indikation Nybildade kärl i berörda senor

Förberedelser ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
Förbered för dukning

**Undersökningens
genomförande**

Vid injektion av läkemedel på ultraljud:

Radiolog utför ultraljud för att avgöra om injektion av läkemedel skall utföras eller ej.

När injektion av läkemedel skall utföras:

Kommunicera med radiolog gällande nålguide/steril strumpa och vilken punktionsnål som skall användas.

Ta fram bedövningsmedel: Carbocain Accord 10 mg/ml

Läkemedel för sklerosering: Aethoxysklerol 10 mg/ml

Sterilduka

Assistera radiologen

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Efter Sklerosering:

Plåstra om och linda aktuellt område.

Sklerosering av knäled:

Informera patienten:

Patienten skall inte belasta benet i 48 timmar.

Undvika fysisk belastning (långpromenader och gympapass) under upptill 2 veckor.

När patienten inte har med sig egna kryckor finns det att låna ut, informera att dom skall tas med vid återbesöket Undvik bilkörning undersökningsdagen.

Skleroseringen av armbåge:

Patienten skall inte belasta sin armbåge i 48 timmar.

Ingen träning eller lyfta tungt med den aktuella armen på upptill 2 veckor.

Utförande radiolog skriver i svaret hur mycket läkemedel som ges i samband med utförd injektion.

Läkemedel

Carbocain 10 mg/ml

Aethoxysklerol 10 mg/ml

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapportera förekommande avvikelser i Med Control Pro (MCP).

Uppföljning utvärdering och revidering

Innehållsansvarig ansvarar för att rutinen uppdateras vartannat år.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Therése Larsson, (thela6), Undersköterska

Granskad av: Hanna Fogel, (hanfo6), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1173

Version: 7.0

Giltig från: 2026-09-03

Giltig till: 2028-08-28