

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2024-06-27

Innehållsansvar: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-06-26

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Cholangiografi, peroperativ eller sekundär - Gallvägar

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Informera patient och föräldrar om vad undersökningen innebär.

Peroperativ	Kontrollera att operationsavdelningen har kontrast
Sekundär	Lägg en operationsduk under katetern Drag upp kontrast enligt ordination, koppla sprutan till katetern, använd eventuellt adapter

Kontrastmedel

Kontrastmängd enligt ordination.

I första hand: Omnipaque 180 mg I/ml.

I andra hand: Visipaque 270 mg I/ml.

Bildtagning

Peroperativ	Frontalbild, samt eventuellt ca 45° vridbild åt vardera hållet.
Sekundär	Utförs i genomlysning av läkare: Frontalbild samt eventuellt vridbilder för friprojektion av gallvägarna och passagen till tarmen.

Material

Antal	Artikel
1	Op-duk
1	Spruta
1	Uppdragskanyl
	Ev. adapter

Uppföljning och utvärdering

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i EI Agfa om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Marie Lyrfors, (marly2), Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1216

Version: 10.0

Giltig från: 2024-06-27

Giltig till: 2026-06-26