

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-03-27

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-03-27

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Esofagus B – Bariumkontrast barn

Arbetsbeskrivning

När prioriteringen är hypofarynx och esofagus med logoped är det en läkarledd undersökning om inte de rtgssk som är ansvariga för videofluoroskopi är på plats.

Förberedelser

Informera barnet och föräldrarna om vad undersökningen innebär.

Använd eventuellt smaktillsats till kontrastmedlet; outspädd saft, chokladpulver etc (**Obs!** chokladpulvret innehåller mjölkpulver).

Kontrastmedel

Bariumkontrast används vid esofagusundersökning på barn över 1 års ålder. Undantag, se ”Esofagus – Jod”.

Liquid Polibar Plus

Mängd färdigblandad kontrast	Blandning: Liquid Polibar Plus	Kallt vatten
2 dl	1 dl	1 dl

Skall förvaras i kylskåp om den ej används omedelbart.

Barnets vikt	Mängd Liquid Polibar Plus
10 kg	50 - 100 ml
20 kg	100 - 200 ml
30 kg	150 - 250 ml
40 kg	200 - 300 ml
50 kg	250 - 350 ml

Administrationssätt: peroralt

Dosen är individuell och kan inte beräknas innan undersökningen är utförd.

Sjuksköterskan antecknar i EI antal ml man gett samt barnets vikt.

Bildtagning

Bildtagning utförs i genomlysning av läkare.

Granskare/Arbetsgrupp

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1242

Version: 11.0

Giltig från: 2025-03-27

Giltig till: 2027-03-27