

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-03-27

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-03-27

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Esofagus J – Jod barn

Arbetsbeskrivning

När prioriteringen är hypofarynx och esofagus med logoped är det en läkarledd undersökning om inte de rtgssk som är ansvariga för videofluoroskopi är på plats.

Förberedelser

Informera barnet och föräldrarna om vad undersökningen innebär.

Använd eventuellt nappflaska eller spruta.

Använd eventuellt smaktillsats till kontrastmedlet (outspädd saft)

Kontrastmedel

Jodkontrast används vid esofagusundersökning av prematura barn, 0-12 månader, samt vid uttalad obstipationsproblematik och vid perforationsrisk.

Visipaque 270 mgI/ml.

Dosen är individuell och kan inte beräknas innan undersökningen är utförd.

Sjuksköterskan antecknar i EI antal ml man gett samt barnet vikt.

Bildtagning

Bildtagning utförs i genomlysning av läkare.

Granskare

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1243

Version: 10.0

Giltig från: 2025-03-27

Giltig till: 2027-03-27