

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn, Verksamhet Klinisk fysiologi
Innehållsansvar: Maria Hagberg, (marha93), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Maria Hagberg, (marha93), Röntgensjuksköterska
Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-06

Giltig till: 2027-02-06

KM Åtgärdskort vid kontrastmedelsutlösta reaktioner Drottning Silvias barnsjukhus

Revideringar i denna version

Uppdaterat namn på läkemedel till T. Caredin, och dosering enligt rekommendationer från Barnläkarföreningen och svensk förening för allergologi. Se: [2024-10-04-SFFA-Nationell-vardprogram](#)

Uppdaterade viktklasser för adrenalinpenna enligt FASS. Infusionsvätska, ändrad dos till 10 ml/kg.

För kortisonbehandling används Betapred.

Lätta reaktioner

Kräkning, enstaka urticariella utslag

Röntgensjuksköterska/BMA

Lugnt omhändertagande.

Kontrollera i.v nål

Tillkalla läkare.

Vb Ge munsönderfallande

T. Caredin vid ordination

<6 år 1 tabl. á 2.5 mg

≥6 år 1 tabl. á 5 mg

**Noggrann observation i minst
30 min.**

Läkare

Vb Ordinera T. Caredin

<6 år 1 tabl. á 2.5 mg

≥6 år 1 tabl. á 5 mg

Anafylaktisk reaktion/chock

Blekhet, kallsvett, illamående, urticaria, svullnadskänsla i hals, andningssvårighet, ödem, tackycardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andningsstillestånd och cirkulationskollaps

Röntgensjuksköterska/BMA	Läkare
<p>Kalla på ansvarig läkare.</p> <p>Larma: Barn – Hjärtlarm och Livshotandetillstånd 39090</p> <p>Avdelning, rum, vån och hus</p> <p>Hämta akutväska</p> <p>Fri luftväg ev. HLR</p> <p>Kontrollera i.v. infart</p>	<p>Leder arbetet med första röntgensjuksköterska/BMA</p> <p>Ge tydliga ordinationer Arbetar efter ABCDE- modellen</p> <p>Fri luftväg, ventilation och ev. HLR</p> <p>Beslutar med narkosläkare fortsatt vårdnivå</p> <p>Kontaktar barnets läkare som meddelar föräldrarna</p>
<p>Ta fram:</p> <p>Adrenalinpenna 150 µg i.m 15-30 kg 300 µg i.m ≥ 30 kg</p> <p>Kan upprepas efter 5-10 min.</p> <p>Ge: Syrgas 6-10 l/min</p> <p>Förbered: Inf Ringer-Acetate eller NaCl 10 ml/kg</p> <p>Förbered:</p> <p>< 6 år 1 ml Betapred 4 mg/ml ≥ 6 år 2 ml Betapred 4 mg/ml</p>	<p>Ordinera:</p> <p>Adrenalinpenna 150 µg i.m 15-30 kg 300 µg i.m ≥ 30 kg</p> <p>Kan upprepas efter 5-10 min.</p> <p>Ordinera: Syrgas 6-10 l/min</p> <p>Ordinera: Inf Ringer-Acetate eller NaCl 10 ml/kg</p> <p>Ordinera:</p> <p>< 6 år 1 ml Betapred 4 mg/ml i.v ≥ 6 år 2 ml Betapred 4 mg/ml i.v</p>

Syfte och bakgrund

Rutin vid tillfälle av kontrastmedelsutlösta reaktioner. Kontaktvägar, läkemedelsbehandling.

Arbetsgrupp

Maria Hagberg, röntgensjuksköterska Radiologi barn

Mela Brink, överläkare Radiologi barn

Granskare

Johan Fredén Lindqvist, överläkare klinisk fysiologimottagning

Håkan Caisander, överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn, Verksamhet Klinisk fysiologi

Innehållsansvar: Maria Hagberg, (marha93),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Maria Hagberg, (marha93), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1255

Version: 8.0

Giltig från: 2025-02-06

Giltig till: 2027-02-06