

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-02-13

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-10

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Perkutan nephrostomi barn

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Undersökningen utförs i narkos.

Kontrollera nedanstående prover innan patienten sövs.

Patientens provsvar finns i Melior.

Blodprovssvar utanför referensområde skall rapporteras till radiolog som i sin tur tar kontakt med patient ansvarig läkare för ställningstagande till åtgärd eller avbokning av undersökning.

Gonadskydd

Gonadskydd ska inte användas eftersom det riskerar att påverka dosautomatiken.

Graviditet

Vid röntgenundersökningar i bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i Agfa.

Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent.

Blodprover

Hb

TPK

PK INR

Blodgruppering (om detta ej finns).

Bastest

Ultraljud skall utföras innan patienten sövs.

Patienten i bukläge och den aktuella sidan lätt uppvriden, med kudde under buken. Patient med transplanterad njure läggs i ryggläge.

Läkemedel

Omnipaque 180 mg I/ml. Kontrastmängd enl. ord.

Bedövning: Chirocaine eller Marcain, dosering se Rutin:

Lokalanestesimedel – lathund för dosering.

Kanyl och spruta.

Material

Tvättset

Descutansvamp

Tvätttork

Operationsrockar

Mössa

Sterila handskar

Operationslakan

Operationsduk självhäftande 4 st

Plastad duk till bordet

Knivblad

Plastskydd till bildförstärkare, manöverpanel och ulj apparat.

Klorhexidinsprit 5mg/ml

NaCl 9mg/ml

10 ml sprutor

Uppdragskanyl

Steril skål med koksalt för att spola igenom kateter och nål som ska användas

Punktionsmaterial

Micropunktionsset Angiotec- skater. (Detta set innehåller alla delar utom kateter).

Mini-Pigtail 6F, 20cm, den har låsbar kringla.

Kateter Molnardisc 6F

Suturset, nålförare, steril sax

Kompresser, Mefix för fixation.

Connector till uribag.

Ultraljudsmaterial

Transducer enligt ordination

C5-1, C8-5 eller L12-5, med tillhörande punktionsset, se tarifoldern i sterilförådet.

Övrigt

Röntgenläkaren skall fylla i interventionsprotokoll, kopia skall medfölja patienten

till avdelningen

Handhavande av instrument efter undersökningen.

Efter användning avlägsna fäste och nålguide från transducern.

Kassera engångsdelarna.

Avlägsna synligt blod med en liten mjuk instrumentborste. (borsten är flergångs). Diska av nålhållaren i plast. Lägg nålhållaren på tork.

Nålhållarna i plast får inte köras i dekontaminatorn. Endast nålhållaren i stål får köras i dekontaminatorn.

OBS! SLÄNG EJ PLASTHÅLLARNA

Granskare/arbetsgrupp

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska Radiologi barn

Mela Brink överläkare Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1347

Version: 14.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-10