

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn
Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj), Röntgensjuksköterska
Granskad av: Jenny Ahlin, (jenma13), Överläkare
Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18

Skelett - Skolios

Arbetsbeskrivning

Skolios

Frontalbild i stående över ryggraden, inkludera C7 – höftledspalter (precis kranialt om symfysen).

Blända in på bredden så att höftledspalten nätt och jämnt inkluderas i bild.

Exponeras med bröstet mot detektorn.

Bedöm om bäckenet är rakt och justera eventuellt med förhöjning under ena foten, vilket i så fall ska markeras på bilden. Vid behov ta lågdos cristabild före undersökningen.

Lab 1 - bländarkant övre gräns.

Lab 2 - ljuskors övre gräns.

Lågdos

Cristabild

Frontalbild inbländad över crista. Om skillnad i bäckenskovlar, mät på bilden och använd förhöjningplattor för korrigerig så att bäckenet hamnar i våg på den stitchade bilden.



Gonadskydd

Ska inte användas.

Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret skall dokumenteras i EI. Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent

Granskare/arbetsgrupp

Madeleine Ljungberg, Röntgensjuksköterska, Radiologi barn

Martin Bonnier, Överläkare, Radiologi barn

Jenny Ahlin, Överläkare, Radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn

Innehållsansvar: Madeleine Ljungberg, (madlj),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Jenny Ahlin, (jenma13), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1376

Version: 4.0

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18