

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Giltig från: 2025-02-14

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-14

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Tunntarmspassage – Standard (Gastro)

Arbetsbeskrivning

Gonadskydd ska användas vid fast inställning (lilla detektorn)

Ska inte användas när vi använder lilla detektorn, i de fall där strålfältet är mindre än 5 cm från gonaderna och gonadskyddet inte riskerar att dölja diagnostisk information.

Gonadskydd ska inte heller användas om patientens båda testiklar inte vandrat ner till pungen.

Dokumentera med Ja eller Nej och kommentar.

Graviditet

Vid röntgenundersökning av bukregionen skall alla kvinnor/flickor över 15 år tillfrågas om de är gravida. Svaret dokumenteras i EI.

Om patienten är gravid måste en berättigandebedömning göras i samråd med radiolog och/eller remittent.

Tunntarmspassager som har påbörjats i genomlysning eller som har prioriterats som ”Tunntarmspassage standard”, kan utföras enligt standardprotokoll d.v.s. utan att det görs en ordination för varje bild.

Ansvarig radiolog skriver i EI att undersökningen ska göras enligt ”Tunntarmspassage standard” och bevakar pågående undersökning.

För att informera personalen på lab 1 och 2 att en undersökning har startats upp, måste radiolog eller röntgensjuksköterska på lab 3 skriva en komplettering när första bilden ska tas på lab 1 eller lab 2.

Röntgensjuksköterska på lab 1 eller 2 tar bilder enligt standardprotokoll, se nedan, utan att kontakta radiolog mellan bilderna. För att ha koll på undersökningen ska röntgensjuksköterskan skriva komplettering enligt schemat.

Bildtagning enligt standardprotokoll.

Tid räknat från kontrastintag

Bild 1	30 min
Bild 2	1 tim
Bild 3	2 tim
Bild 4	4 tim
Bild 5	6 tim
Bild 6	Fråga radiolog när bild ska tas

Bilderna tas tills undersökningen avslutas av ansvarig radiolog. Om rtgssk tycker att det ser klart ut innan alla bilder enligt protokoll är tagna, kontakta ansvarig radiolog.

När ventrikeln är tömd på kontrast kan röntgensjuksköterskan ge patienten tillåtelse att äta utan att ha tillfrågat radiolog. OBS! Patienter som ev ska opereras ska ej äta eller dricka.

Granskare

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi barn

Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Mela Brink, (melbr), Överläkare

Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1393

Version: 16.0

Giltig från: 2025-02-14

Giltig till: 2027-02-14