

Gäller för: Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn  
Innehållsansvar: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska  
Granskad av: Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska  
Godkänd av: Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-03

Giltig till: 2027-12-03

# Ventrikel – Duodenum – Jod barn

## Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Informera barn och föräldrar om vad undersökningen innebär.

Kontrollera att patienten ej ätit eller druckit.

Använd eventuellt nappflaska, spruta eller ventrikelsond.

Använd eventuellt smaktillsats till kontrastmedlet (outspädd saft)

## Kontrastmedel

Jodkontrast används vid ventrikel – duodenumundersökningar av prematura barn och

barn 0 - 12 månader samt vid obstipationsproblematik och vid perforationsrisk.

Visipaque 270 mg I/ml max 5 ml/kg. Max totaldos 200 ml.

Administrationssätt: peroralt

Dosen är individuell och kan inte beräknas innan undersökningen är utförd.

Sjuksköterskan antecknar i EI antal ml man gett samt barnets vikt.

## **Bildtagning**

Bildtagning utförs i genomlysning av läkare. De olika delarna av ventrikeln samt duodenum skall undersökas.

Kontrollera reflux, tömning, och malrotation.

## **Frågeställningar**

Pylorusstenos            Barnet ska komma till röntgenavdelningen med en sond nedlagd i ventrikeln.

Reflux, tömning  
och malrotation

## **Granskare/Arbetsgrupp**

Lisa Setterlund röntgensjuksköterska radiologi barn

Mela Brink överläkare radiologi barn

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet hälsoprofessioner och radiologi barn

**Innehållsansvar:** Linda Bagheri, (linba35),  
Röntgensjuksköterska

**Granskad av:** Linda Bagheri, (linba35), Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Yvonne Simrén, (yvosi1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-1397

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-12-03

**Giltig till:** 2027-12-03