OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi
Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-02
Giltig till: 2028-07-02

Åtgärdskort vid kontrastmedelsutlösta reaktioner

Radiologi Sahlgrenska, Radiologi Mölndal, Hybrid och intervention

Lätta reaktioner		
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska		**Läkare**
Lugnt omhändertagande Kontrollera och säkra intravenösinfart Konsultera läkare vid behov **Observation i minst 30 min**		**Ordinera:** 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande

Anafylaktisk reaktion/chock		
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska		**Läkare**
Hjärtlarm 3 9090		**Hjärtlarm 3 9090**
Kalla på läkare **Ge enligt generell ordination** Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Syrgas 6–10 l/min **Säkra/sätt intravenös infart**		**Ordinera:** Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Kan upprepas efter 5–10 min **Ordinera:** Syrgas 6–10 l/min **Ordinera:** inf. Ringer-acetat/NaCl i.v. **Ordinera:** 2 ml. Inj. Betametason 4mg/ml i.v.

Godkänd av
Caroline Sandahl Molinder, verksamhetschef Radiologi
Sophie Lindgren, verksamhetschef Hybrid och intervention

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Cornelia Wahlgren, (corwa2), Röntgensjuksköterska, Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska, Jeanette Carlqvist, (jeaek3), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1451

Version: 13.0

Giltig från: 2026-07-02

Giltig till: 2028-07-02