

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-05-21

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-05-13

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Åtgärdskort vid kontrastmedelsutlösta reaktioner

Radiologi Sahlgrenska, Radiologi Mölndal, Hybrid och intervention

Lätta reaktioner	
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska	Läkare
Lugnt omhändertagande Kontrollera och säkra intravenösinfart Konsultera läkare vid behov Ge: 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande Observation i minst 30 min	Ordinera: 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande

Anafylaktisk reaktion/chock	
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska	Läkare
Kalla på läkare Hjärtlarm Ge: Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Kan upprepas efter 5–10 min Ge: Syrgas 6–10 l/min Ge: Inf Ringer-Acetat/NaCl i.v. Ge: 2 ml Inj Betametason 4 mg/ml i.v. Hjärtlarm 3 9090	Ordinera: Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Kan upprepas efter 5–10 min Ordinera: Syrgas 6–10 l/min Ordinera: Inf Ringer-Acetat/NaCl i.v. Ordinera: 2 ml Inj Betametason 4 mg/ml i.v. Hjärtlarm 3 9090

Godkännare

John Brandberg, verksamhetschef Radiologi

Sophie Lindgren, verksamhetschef, Hybrid och Intervention

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Hybrid och intervention, Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska, Sophie Lindgren, (sopli2), Verksamhetschef

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1451

Version: 12.0

Giltig från: 2025-05-21

Giltig till: 2027-05-13