

DT TB11 DT Thorax och Buk PD-läckage

Us kod/Us namn 840897/ DT Buk med iv kontrast i kateter, sond, drän eller fistel

Indikation Misstanke om läckage från PD (påsdialys)

Serieöversikt

Serie 1	Thorax och Buk utan kontrast
Serie 2	Thorax och Buk efter kontrast via påsdialys

Serie 1 och 2 utförs på samma remissnummer

Förberedelser

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet.
Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i Agfa.

Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år) om eventuell graviditet.

Om gravid; kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en individuell bedömning om undersökningen är berättigad.

Undersökningen samordnas med PD-mottagningen då patienten ska undersökas före och 6 timmar efter påsdialys-start.

Efter serie 1 ska 100 ml Omnipaque 240mg I/ml skickas med patienten till PD-mottagningen eller hämtas av personal. Kontrast, 80 ml blandas i påsdialys på PD-mottagningen.

Patientpositionering

Ryggläge

Fötterna först, armarna upp

Patientcentrering	Halsgropen SN/GE Haka/Siemens, Canon
Kontrastmedel	Enligt läkarordination Omnipaque 240mg I/ml, 80 ml som blandas i påsdialys och ges på PD-mottagningen
DFOV	Planeras för varje patient
Scout	Lateral och frontal
Scanområde/kriterier	Från lungapex till trochanter minor Serie 1 tas på morgonen innan påsdialys utförs Serie 2 tas efter avslutad påsdialys, ca 6 timmar efter dialysstart

Serie 1. Utan kontrast



Serie 2. Med kontrast



Dokumentation

Dokumentera i RIS enligt rutin.

Om kriterier inte uppnås för undersökningen ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Strålskydd

Metoden är optimerad genom automatisk exponeringskontroll och stråldosreducerande rekonstruktion.

Där det är möjligt används DT`ns optimering för strålkänsliga organ.

Rekonstruktioner

Serie	Arkivering
Ba1 Thorax-Buk utan kontrast	Agfa
Ba2 Thorax-Buk med kontrast via påsdialys	Agfa
Scouter Dosrapporter	Agfa

Övrigt

Undersökningen koordineras tillsammans med samordnande sjuksköterska på avd 131/PD-mottagningen.

Telefon: 211 31

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Referenser

[Strålsäkerhet - Sahlgrenska Universitetssjukhuset](#)

[LM Intravenösa infarter, hantering och administrering \(vgregion.se\)](#)

[LM Överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel, behandling, dokumentation och checklista](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Monica Lindqvist, (monli27),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Marit Johannesson, (marjo154),
Specialröntgensjuksköterska, Monica Lindqvist, (monli27),
Specialröntgensjuksköterska

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-2071

Version: 1.0

Giltig från: 2024-12-20

Giltig till: 2026-12-20