

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-04-29

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-04-28

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

LM Information om förberedelse vid kontrastmedelsöverkänslighet

I sällsynta fall kan en överkänslighet utvecklas mot röntgenkontrastmedel. Följer du läkarordination enligt nedanstående schema minimeras denna risk och undersökningen kan utföras som planerat.

Behandlingsschema

Kvällen före undersökningsdagen

- 10 tabletter Betametason 0,5 mg upplösta i lite vatten
- 2 munsönderfallande tabletter antihistamin (tex Caredin à 5 mg) som smälter i munnen

Undersökningsdagens morgon

- 10 tabletter Betametason 0,5mg upplösta i lite vatten
- 2 munsönderfallande tabletter antihistamin (tex Caredin à 5 mg) som smälter i munnen

Har du diabetes kan ditt blodsocker höjas på grund av läkemedlet Betametason som är ett kortisonpreparat. Vid behov diskutera detta med din läkare/diabetessköterska.

Behöver du komma i kontakt med Radiologi se kontaktuppgifter i kallelsen.

För allmänna frågor hänvisas till 1177 VÅRDGUIDEN

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska, Jeanette Carlqvist, (jeaek3), Överläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-794

Version: 14.0

Giltig från: 2025-04-29

Giltig till: 2027-04-28