

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-07-02

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-07-02

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

Åtgärdskort vid kontrastmedelsutlösta reaktioner Radiologi Östra

Lätta reaktioner	
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska	Läkare
Lugnt omhändertagande Kontrollera och säkra intravenös infart Konsultera läkare vid behov Observation i minst 30 min	Ordinera: 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande

Anafylaktisk reaktion/chock	
Röntgensjuksköterska/sjuksköterska	Läkare
Narkoslarm 3 90 90	Narkoslarm 3 90 90
Kalla på läkare Ge enligt generell ordination Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Syrgas 6–10 l/min Säkra/sätt intravenös infart	Ordinera: Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Kan upprepas efter 5–10 min Ordinera: Syrgas 6–10 l/min Ordinera: inf. Ringer-acetat/NaCl i.v. Ordinera: 2 ml. Inj. Betametason 4mg/ml i.v.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Granskad av: Cornelia Wahlgren, (corwa2),
Röntgensjuksköterska, Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska,
Jeanette Carlqvist, (jeaek3), Överläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-797

Version: 12.0

Giltig från: 2026-07-02

Giltig till: 2028-07-02