

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-05-21

Innehållsansvar: Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-05-13

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

## Åtgärds kort vid kontrastmedelsutlösta reaktioner Radiologi Östra

<b>Lätta reaktioner</b>	
<b>Röntgensjuksköterska/sjuksköterska</b>	<b>Läkare</b>
Lugnt omhändertagande Kontrollera och säkra intravenösinfart Konsultera läkare vid behov  <b>Ge:</b> 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande.  <b>Observation i minst 30 min</b>	<b>Ordinera:</b> 2 Tabletter antihistamin, munsönderfallande
<b>Anafylaktisk reaktion/chock</b>	
<b>Röntgensjuksköterska/sjuksköterska</b>	<b>Läkare</b>
Kalla på läkare <b>Hjärtlarm</b>  <b>Ge:</b> Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. enligt generellordination.  <b>Ge:</b> Syrgas 6–10 l/min  <b>Ge:</b> Inf Ringer-Acetat/NaCl i.v.  <b>Ge:</b> 2 ml Inj Betametason 4 mg/ml i.v. efter läkarordination  <b>Narkoslarm 3 9090</b>	<b>Ordinera:</b> Upprepad dos, Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m. Kan upprepas efter 5–10 min  <b>Ordinera:</b> Syrgas 6–10 l/min  <b>Ordinera:</b> Inf Ringer-Acetat/NaCl i.v.  <b>Ordinera:</b> 2 ml Inj Betametason 4 mg/ml i.v.  <b>Narkoslarm 3 9090</b>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska

**Granskad av:** Niklas Lundqvist, (niklu), Sjuksköterska, Jeanette Carlqvist, (jeaek3), Överläkare

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-797

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-05-21

**Giltig till:** 2027-05-13