

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2026-02-26

Innehållsansvar: Magdalena Koniarska, (magko3), Specialröntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-02-26

Granskad av: Ivan Cetinic, (ivace1), Specialistläkare

Godkänd av: Caroline Sandahl Molinder, (carwe12), Verksamhetschef

## Buk tunntarmspassage

<b>Us kod/Us namn</b>	430000 / Tunntarmspassage
<b>Indikation</b>	Passage vid ileus
<b>Förberedelser</b>	<p>Granska remiss och ev. tidigare undersökningar</p> <p>ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet</p> <p>Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS</p> <p>Avlägsna föremål som skymmer us-området</p> <p>Kompression skall ej användas</p> <p>Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)</p> <p>Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej</p> <p>Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.</p> <p>Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs</p> <p>Sätt sidomarkering</p> <p>Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd</p>

## Kontrastmedel

Ja

Tillfråga om ev. kontrastallergi.  
Kontrast ges enligt ordination.

För beredning av kontrast se:

[LM Beredning av gastrointestinalt kontrastmedel vid konventionell röntgen](#) (beredning för “Akut tunntarmspassage”)

Fyll i information i dokument för passage som skickas med kontrastmedel till remitterande enhet.

[Tunntarmspassage - lappar](#)

Avdelning fyller i vilken tidpunkt patienten har druckit kontrast. Första bilden tas 2 h efter kontrastintaget om inte läkaren ordinerar annat. Ifylld tunntarmspassagelapp skall skickas med patienten till röntgen vid första bildtagningstillfället och skannas in under aktuellt SU nummer.

### Jourtid från kl. 24.00 - 06.00

- Bild 1 tas efter 2 timmar om detta infaller före kl. 24:00
- Bild 2 tas kl. 06.00-08:00 (kompletteringsuppgift av radiolog behövs ej, utan tas oavsett)
- Om kontrast ges efter kl. 24.00 tas första bild mellan kl. 06.00 -08.00
- Undersökningen granskas av SU radiologi nästa morgon dvs. bilderna ska EJ skickas till TMC

## Bildtagning/Projektioner

### **Frontal**

Position	Patienten ligger på rygg på bordet. Bilderna tas AP.
Centrering	Bild 1: Övre bländarkanten ovanför diafragman.  Bild 2: Nedre bländarkanten nedanför symfysen.
Vinkel	0°
Kriterier	Två frontalbilder skall gå omlott. Täck in diafragma och ner till symfysen. Skriv antalet timmar sedan kontrasten gavs på bilderna.
FFA	110 cm



### **Horisontell sida** (tas endast på begäran från en radiolog)

Position	Patienten ligger på rygg på bordet. Bilden tas horisontellt. Vrid ev. patienten för att få en rak sidobild av stomipåsen.
Centrering	Med stomipåsen i focus
Vinkel	0°
Kriterier	Stomipåse i sin helhet. Skriv på bilden antalet timmar sedan kontrasten gavs. Markera med ”HORISONTELL”
FFA	110 cm



<b>Strålskydd</b>	Se under rubriken förberedelser
<b>Dokumentation</b>	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss
<b>Ansvar</b>	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP)
<b>Övrigt</b>	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilderna Bilder skickas till BFR
<b>Referenser</b>	<a href="#">Strålsäkerhet</a>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Magdalena Koniarska, (magko3),  
Specialröntgensjuksköterska

**Granskad av:** Ivan Cetinic, (ivace1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-813

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-02-26

**Giltig till:** 2028-02-26