

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2025-06-16

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Giltig till: 2027-06-09

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Mitomycin-problem och åtgärder under behandling

Arbetsbeskrivning

Problem	Åtgärd	Kommentar
Residualurin > 100 ml	Lösningen ska tappas ut efter 1 timmar eller vid urinträngningar.	
Hematuri	Mitomycin ska inte ges vid kraftig hematuri. Mitomycin kan ges igen när patienten inte har haft hematuri under 1–2 dagar.	
Av något skäl anser du att Mitomycin inte kan ges idag . Patienten är missnöjd med det.	Stå på dig. Det är du som vet bäst.	Om behandlingen blir fördröjd en eller ett par veckor spelar ingen roll för resultatet. Patienten har rest till sjukhuset och kanske tagit ledigt från jobbet, men det får inte göra att du låter dig påverkas och tar risker. Behandlingen är inte ofarlig. Anser du att behandlingen inte kan ges idag så innebär det ju att patienten skulle kunna få allvarliga besvär om du ger instillationen.
Sveda i uretra efter föregående behandling	Ta ställning till ev. tappning så slipper patienten att kissa ut medlet. Ev. Xylocain i uretra innan.	
Patienten är återställd efter föregående behandling men anger att han/hon hade feber eller frossa efter föregående instillation	Lättare temp stegring eller frossa – oförändrad regim. Temp > 38,5° eller frossa – lösningen tappas ut efter t.ex. 5 minuter.	Framförallt äldre människor tål feber dåligt. Feber och frossa inger misstanke om att allvarliga biverkningar kan uppkomma. Feber och frossa är alltså inte önskvärt.
Patienten är inte återställd efter föregående Mitomycin-instillation, utan har till exempel fortfarande täta trängningar .	Ingen Mitomycin-behandling ges idag. Ta en urinodling. Ge en ny tid om 1–2 veckor. Sök efter urinodlingssvaret efter några dagar och ge antibiotika efter resistensbestämning. Om patienten är återställd när han/hon kommer efter 1–2 veckor ska lösningen	Orsaken till att patienten inte är återställd kan vara att han/hon har fått en UVI. Oftast är det inte bakterier som orsakar det långvariga trängningarna, utan det är en kraftig allergisk reaktion av Mitomycinet. Antibiotika hjälper då inte och det är bara att avvakta att kroppen självläker detta. Ibland kan det ta flera veckor. Mitomycin får inte ges förrän vattenkastningen normaliserats.

	kissas eller tappas ur efter 30 minuter för att inte samma sak ska ske igen.	
Utslag/blåsor i händerna	Avsluta behandlingen	
Urticaria/klåda på kroppen	Avsluta behandlingen	

Ansvar

Vårdenhetschef på Urologimottagningen ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef på Urologimottagningen ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i Med Control Pro

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-100

Version: 6.0

Giltig från: 2025-06-16

Giltig till: 2027-06-09