

Gäller för: Verksamhet Urologi

Giltig från: 2025-11-27

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Giltig till: 2027-11-14

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Perioperativ trombosprofylax i samband med RALP, med eller utan ePLND

Syfte

Standardiserade trombosprofylax vid RALP

Arbetsbeskrivning

Riktlinjerna baserar sig på EAU:s dokument "EAU Guidelines on Thromboprophylaxis in Urological Surgery" 2017 (<http://uroweb.org/guideline/thromboprophylaxis/>).

Viktiga begrepp:

- Trombosprofylax: en pågående långsiktig profylaktisk behandling som syftar att minska risken för trombos som patienten "bär med sig". Kan vara av typen antikoagulation (Waran, NOAK, lågmolekylärt heparin) eller trombocythämning (ASA, Clopidrogel, Efiend, Brilique m.fl.)
- Perioperativ trombosprofylax: kortvarig trombosprofylaktisk behandling (i regel med Fragmin) som ges enbart perioperativt där operationens trombosrisk bedöms motivera detta.
- OBS!! Det är den anmälande specialistens ansvar att ange om, och i så fall hur, perioperativ profylax skall tillämpas, och dokumentera detta tydligt i journalen.

A: Patienter som INTE står på någon tidigare trombosprofylax

- Patienter som genomgår RALP utan ePLND:
Perioperativ trombosprofylax med Fragmin ges som regel inte.

Undantag enligt operatörens beslut.

Kompressionsstrumpa ges alltid.

- Patienter som genomgår RALP med ePLND:
Perioperativ trombosprofylax med Fragmin ges alltid.
Kompressionsstrumpa ges alltid.
- Perioperativ trombosprofylax ges förekommande fall som Fragmin 5000 E x 1 med start från första postoperativa morgonen under 4 veckor. Rekommenderad tid för kompressionsstrumpa är till full mobilisering, eller längre vid bensvullnad.

B: Patienter som står på tidigare trombosprofylax

- Här skiljer sig rekommendationerna beroende på indikationen och typen av profylax antikoagulation (Waran, NOAK, lågmolekylärt heparin) eller trombocythämning (ASA, Clopidrogel, Efient, Brilique m.fl.).
- För individuell rekommendation konsultera Guidelines (<http://uroweb.org/guideline/thromboprophylaxis/>). V.b. konsultation med kardiolog eller annan ansvarig läkare.

Ansvar

All berörd personal inom Verksamhet Urologi, är ansvarig för utförandet av rutinens aktiviteter.

Verksamhetschef bär ansvar för att denna rutin blir känd och ansvarar för att den finns.

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvarig och verksamhetschef ansvarar för uppföljning/ revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Johan Rubenson, (johru2), Sektionschef

Granskad av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-114

Version: 3.0

Giltig från: 2025-11-27

Giltig till: 2027-11-14