

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Jenny Magnusson, (jenma18), Specialistläkare

Granskad av: Jenny Magnusson, (jenma18), Specialistläkare

Godkänd av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Giltig från: 2024-12-04

Giltig till: 2026-12-04

Uretrotomia interna

Syfte

Informationen är framtagen för att säkerställa en säker vård och ge ett strukturerat arbetssätt för omhändertagande av patienter.

Arbetsbeskrivning

Innan undersökningen

- Kontrollera alltid patientens identitet
- Fråga om eventuell allergi mot läkemedel, inklusive Xylocain
- Utsättning av antikoagulantia enligt medicinskt styrdokument
Utsättning av antikoagulantia inför operation. Tar patienten Waran ska ett PK-värde tas samma dag.

Tillvägagångssätt

- Ren rutin som vid cystoskopi.
- Patienten ligger i benstöd, tvättas med Descutan och 20 ml Xylocaingel 2 % instilleras i uretra.
- Rak optik 12°.
- Operatören väljer 15,5-Ch uretrotom eller 22-Ch uretrotom.
- Vid behov kan en uretärkatetern eller guidewire föras in i uretra.
- Operatören sätter vanlig kateter eller open-end-kateter, oftast 16 Ch.
- Katetertid 3–7 dagar.

Information till patienten efter undersökningen

- Ökat vätskeintag.

- Sveda och lite hematuri under några dagar.
- Vid riklig blödning, problem att kissa efter kateterdragning, smärta och/eller feber > 38 grader ta kontakt med urologmottagningen eller söka akut.

Ansvar

Vårdenhetschef ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i MedControl PRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: Jenny Magnusson, (jenma18), Specialistläkare

Granskad av: Jenny Magnusson, (jenma18), Specialistläkare

Godkänd av: Henrik Kjölhede, (henkj2), Sektionschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-140

Version: 4.0

Giltig från: 2024-12-04

Giltig till: 2026-12-04