

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: John Åkerlund, (johak2), Överläkare

Granskad av: John Åkerlund, (johak2), Överläkare

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-25

Alunlösning intravesikalt

Förändringar sedan föregående version

Förtydligande att indikationen till hematuri kan vara av olika orsak och inte enbart kopplad till hematuri vid blåstumör.

Syfte

Att säkra medicinsk handläggning och omvårdnad av patienter som får Alunlösning intravesikalt.

Indikation

Vid hematuri av olika orsak kan instillation av 1 % alunlösning prövas.

Arbetsbeskrivning

Spola först rent urinblåsan med Natriumklorid. Instillera därefter 50 ml alunlösning i urinblåsan. Stäng katetern under 20 minuter eller tills patienten får trängningar. Öppna därefter katetern och töm blåsan.

Distribuering

Alunlösning distribueras i 500 eller 1000 ml flaskor via apoteket. Tillverkning sker på Beredningsenheten (APL) SU/Östra. [Blankett](#) för beställning till apoteket återfinns på SU:s hemsida under Läkemedel.

Förvaring

Hållbarhet för oöppnad flaska är 6 månader och på en öppnad flaska 24 timmar.

Ansvar

Läkemedelsansvarig läkare ansvarar för utförandet av rutinen samt att den är känd och följs

Uppföljning, utvärdering och revision

Läkemedelsansvarig läkare ansvarar för uppföljning av rutinen och att avvikelser hanteras i MedControl PRO

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Urologi

Innehållsansvar: John Åkerlund, (johak2), Överläkare

Granskad av: John Åkerlund, (johak2), Överläkare

Godkänd av: Ali Khatami, (alikh), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-216

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-25