

Gäller för: Verksamhet Njurmedicin

Giltig från: 2026-01-29

Innehållsansvar: Anna Palo, (annsv90), Medicinsjuksköterska

Giltig till: 2028-01-28

Granskad av: Sigrídur Elíasdóttir, (sigel1), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Rosander, (cecro3), Verksamhetschef

ACCESS AV-fistel AV-graft nedläggning

Revideringar i denna version

Armen kan vara lindad i upp till 6 veckor efter operation om kirurgen anser det.

Syfte

Kärlaccess inför hemodialysbehandling som behöver tas bort eftersom patienten gått ur dialys eller av medicinska skäl.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Blodprover tas dagen innan operationen (Hb, TPK, APTT, PK, Na, K, och Kreatinin). Vid högt kaliumvärde före operation ordinerar P.Resonium eller akut dialysbehandling.

Kontroll av att blodgruppering finns. Bastest ska tas inför operationen.

Waran sätts ut en vecka före operationen, vid behov ges injektion Fragmin.

Vid nedläggning av AV-fistel /graft och GFR <30 ml/min sätts Eliquis ut 72 timmar före ingreppet och Xarelto ut 3 dagar före operation och Pradaxa 4 dagar före operation. Vid GFR >30 ml/min sätts dessa läkemedel ut 48 timmar före kirurgi.

Behandlande läkare bedömer om Fragminbehandling behövs som ersättning.

Clopidogrel och Brilique sätts ut senast 5 dagar före operation.

Patienten kan stå kvar på Trombyl.

Bedömning och märkning av operationsarm skall göras av den kirurg som skall operera patienten.

EKG tas dagen före operationen inför narkosbedömningen.

Patienten skall till pre-operativt center för narkosbedömning med egen ifylld hälsodeklaration. Alternativt faxa hälsodeklaration efter överenskommelse med pre-op-center. Bedömningen sker då via elektronisk journal. Patient som ska operera underarmsfistel i lokalbedövning bedöms alltid elektroniskt.

Patienten svälter från kl. 24.00 dagen före operationen.

Kontrollera att patienten har ID-band. Premedicinering enligt ordination på anestesijournalen.

Patienten skall dubbelduscha med Descutan på kvällen innan operation och på operationsdagens morgon.

Eftervård

Efter fistelnedläggning ska fistelarmen vara lindad i 4-6 veckor.

Kontrollera så att patienten kan linda den själv annars bokas tid på patientens njurmottagning. Går patienten i dialys kan detta göras på dialysen. Patienten ska få muntlig och skriftlig information om detta innan hemgång.

Relaterad information

[https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su3993-226878784-534/surrogate/Njuravd-Checklista%20Access%20avfistel%20avgraft%20Checklista AV- fistel / graft nedläggning](https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su3993-226878784-534/surrogate/Njuravd-Checklista%20Access%20avfistel%20avgraft%20Checklista%20AV-fistel%20graft%20nedlaggning)

[Alfresco » \(vgregion.se\)](#) Hälsodeklaration

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Njurmedicin

Innehållsansvar: Anna Palo, (annsv90), Medicinsjuksköterska

Granskad av: Sigrídur Elíasdóttir, (sigel1), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Rosander, (cecro3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9803-2137832294-6

Version: 12.0

Giltig från: 2026-01-29

Giltig till: 2028-01-28